


# 志布志市

## 1.1 志布志市の基礎情報



地形図（志布志市）

(出典)

<https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html#relief>

自然的条件に関連する統計値は以下のとおりです。

- 森林面積: 15,710.0 m<sup>2</sup> (2015年) (志布志市)
- 自然災害によるり災者数: 211 人 (2019年) (鹿児島県)
- 主要湖沼面積: 0 ha (2019年) (志布志市)
- 年平均相対湿度: 73.0 % (2020年) (鹿児島県)
- 日照時間(年間): 2,041.4 時間 (2020年) (鹿児島県)

(出典)

統計ダッシュボード (<https://dashboard.e-stat.go.jp/>)

(ア) 人口推移


志布志市の人口は2020年度時点で約29,108人、15歳未満人口は4,016人（13.8%）、15～64歳人口は14,579人（50.1%）、65歳以上人口は10,513人（36.1%）となっています。

近年の人口は減少傾向にあり、2015年度から2020年度までの間に人口は7%減少しました。

※ 上記では近年の人口の傾向について、増減率が2%以下の場合は「ほぼ横ばいの傾向」、それ以上の増減があった場合は「増加傾向」、「減少傾向」と表現しています。

(出典)


統計ダッシュボード (<https://dashboard.e-stat.go.jp/>)



人口の推移 (志布志市)

(出典)

統計ダッシュボード (<https://dashboard.e-stat.go.jp/>)



年齢別人口分布 (志布志市)

(出典)


統計ダッシュボード (<https://dashboard.e-stat.go.jp/>)

## 1.2 これまでの志布志市の気候の変化

### 1.2.1 気温

#### (1) 年平均気温・最低気温・最高気温


志布志市の年平均、最低、最高気温は短期的な変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には年平均気温において、100年あたり約2.5℃の割合で上昇しています(42年分の観測結果に基づき算出)。



年平均気温の推移 (志布志)

(出典)


国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成



日最高気温の年平均の推移 (志布志)

(出典)

国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成



日最低気温の年平均の推移 (志布志)


(出典)

国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成

### 1. 真夏日・猛暑日、冬日・真冬日

真夏日（日最高気温が30℃以上）の年間日数については、100年あたり約26.5日の割合で上昇しています(42年分の観測結果に基づき算出)。


猛暑日（日最高気温が35℃以上）の年間日数については、100年あたり約1.3日の割合で上昇しています(42年分の観測結果に基づき算出)。



真夏日日数の推移 (志布志)

(出典)


国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成



猛暑日日数の推移 (志布志)

(出典)

国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成




冬日日数の推移 (志布志)

(出典)

国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成


1.2.2 降水、降雪



年間降水量の推移 (志布志)

(出典)


国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成



100mm以上の降雨日数の推移 (志布志)

(出典)

国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成



年間無降水日数の推移 (志布志)

(出典)


国立環境研究所による気象庁提供「過去の気象データ」の解析結果をもとに作成

## 1.3 将来の志布志市の気候・気象の変化

### 1.3.1 気温

#### (1) 年平均気温

志布志市では、厳しい温暖化対策をとらない場合(RCP8.5シナリオ)、21世紀末(2081年～2100年)には現在(1981年～2000年)よりも年平均気温が約4.5℃高くなると予測されています。パリ協定の「2℃目標」が達成された状況下であり得るシナリオ(RCP2.6シナリオ)では、21世紀末(2081年～2100年)には現在(1981年～2000年)よりも年平均気温が約1.9℃高くなると予測されています。



日平均気温の推移予測 (志布志市)

(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ


石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.




RCP 2.6 2011-2020年




RCP 8.5 2011-2020年




RCP 2.6 2051-2060年



RCP 8.5 2051-2060年




RCP 2.6 2091-2100年



RCP 8.5 2091-2100年


日平均気温 基準期間との差



(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ

石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.



日最高気温の推移予測 (志布志市)

(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ


石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.




RCP 2.6 2011-2020年




RCP 8.5 2011-2020年




RCP 2.6 2051-2060年



RCP 8.5 2051-2060年



RCP 2.6 2091-2100年



RCP 8.5 2091-2100年


日最高気温 基準期間との差



(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ

石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.




日最低气温の推移予測 (志布志市)


(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ


石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.




RCP 2.6 2011-2020年




RCP 8.5 2011-2020年




RCP 2.6 2051-2060年



RCP 8.5 2051-2060年




RCP 2.6 2091-2100年



RCP 8.5 2091-2100年

日最低気温 基準期間との差



(出典)


以下を基にした A-PLAT WebGISデータ

石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.

## 1. 真夏日・猛暑日、冬日・真冬日

志布志市では、厳しい温暖化対策をとらない場合(RCP8.5シナリオ)、基準年(1981～2000年の平均)と比べ猛暑日が100年間で年間約31日増加、真夏日が約72日増加すると予測されています。パリ協定の「2℃目標」が達成された状況下であり得るシナリオ(RCP2.6シナリオ)では、猛暑日が100年間で年間約4日増加、真夏日が約27日増加すると予測されています。

※ 100年後の値は2081～2090、2091～2100年の平均を用いています。




猛暑日の推移予測 (志布志市)


(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ


石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.




RCP 2.6 2011-2020年




RCP 8.5 2011-2020年




RCP 2.6 2051-2060年



RCP 8.5 2051-2060年




RCP 2.6 2091-2100年



RCP 8.5 2091-2100年


猛暑日 基準期間との差



(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ

石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.



真夏日の推移予測 (志布志市)

(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ

石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.




図 31 真夏日 基準期間との差

(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ

石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正  
気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.1  
7595/20200415.001.


### 1.3.2 降水、降雪

志布志市では、厳しい温暖化対策をとらない場合(RCP8.5シナリオ)、21世紀末(2081年~2100年)には現在(1981年~2000年)よりも降水量が年間約14%増加、無降水日数が約6日減少すると予測されています。また、降雪量は約12cm減少すると予測されています。パリ協定の「2℃目標」が達成された状況下であり得るシナリオ(RCP2.6シナリオ)では、降水量は約1%増加、無降水日数は約5日増加すると予測されています。また、降雪量は約6cm減少すると予測されています。

(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ

石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.




降水量の推移予測 (志布志市)


(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ


石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.



RCP 2.6 2011-2020年




RCP 8.5 2011-2020年




RCP 2.6 2051-2060年



RCP 8.5 2051-2060年




RCP 2.6 2091-2100年



RCP 8.5 2091-2100年


降水量 基準期間との差




(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ


石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.




RCP 2.6 2011-2020年




RCP 8.5 2011-2020年




RCP 2.6 2051-2060年



RCP 8.5 2051-2060年




RCP 2.6 2091-2100年



RCP 8.5 2091-2100年


日降水量100mm以上の日数 基準期間との差




(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ


石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.




RCP 2.6 2011-2020年




RCP 8.5 2011-2020年




RCP 2.6 2051-2060年



RCP 8.5 2051-2060年




RCP 2.6 2091-2100年



RCP 8.5 2091-2100年

無降水日数 基準期間との差



(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ

石崎 紀子 (2020). CMIP5 をベースにした CDFDM 手法による日本域バイアス補正気候シナリオデータ, Ver.201909, 国立環境研究所 地球環境研究センター, doi:10.17595/20200415.001.

### 1.3.3 将来の影響

#### (1) 農業


##### ① 水稲

志布志市では、最も気候変動が進んだ場合（RCP8.5シナリオ）、21世紀末には現在よりも水稲の収量が約11%増加すると予測されています。

(出典)

以下を基にした A-PLAT WebGISデータ


<https://adaptation-platform.nies.go.jp/conso/report/O-4.html>



(出典)


以下を基にした A-PLAT WebGISデータ

<https://adaptation-platform.nies.go.jp/conso/report/O-4.html>



1.3.4 将来の影響

(19) 陸域生態系




(出典)

<https://adaptation-platform.nies.go.jp/conso/report/O-6.html>




RCP 2.6 21世紀半ば



RCP 8.5 21世紀半ば




RCP 2.6 21世紀末



RCP 8.5 21世紀末

熱中症搬送者数




単位: 倍


熱中症搬送者数 凡例

(出典)


[https://www.nies.go.jp/s8\\_project/symposium/20141110\\_s8br.pdf#page=12](https://www.nies.go.jp/s8_project/symposium/20141110_s8br.pdf#page=12)




RCP 2.6 21世紀半ば



RCP 8.5 21世紀半ば




RCP 2.6 21世紀末



RCP 8.5 21世紀末

熱ストレス超過死亡数



単位: 倍

熱ストレス超過死亡数 凡例

(出典)

[https://www.nies.go.jp/s8\\_project/symposium/20141110\\_s8br.pdf#page=12](https://www.nies.go.jp/s8_project/symposium/20141110_s8br.pdf#page=12)