

## 農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、令和元年10月9日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

| 登録番号    | 農薬名（商品名）   | 農薬の種類名           | 製造者名        |
|---------|------------|------------------|-------------|
| 第23677号 | タチガレファイト液剤 | ヒドロキシイソキサゾール複合肥料 | 宇都宮化成工業株式会社 |

### ■変更内容及び変更理由

#### 【変更内容（適用削除および今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

- ・作物名「稲(箱育苗)」のヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数を「4回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内、本田では1回以内)」から「3回以内(移植前の土壌混和は1回以内、移植前の土壌灌注は2回以内)」へ変更する。

#### 【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

##### [変更前]

| 作物名        | 適用病虫害名<br>使用目的                               | 希釈<br>倍数     | 使用液量   | 使用時期         | 本剤の<br>使用<br>回数 | 使用方法 | ヒドロキシイソキサゾールを<br>含む農薬の総使用<br>回数                                |
|------------|--|--------------|--|--------------|-----------------|------|--|
| 稲<br>(箱育苗) | 根の生育促進<br>移植時の発根<br>及び活着促進                   | 500～<br>600倍 | 育苗箱(30×<br>60×3cm、使<br>用土壌約5<br>L)1箱当り<br>500～1000mL | は種時及<br>び発芽後 | 2回<br>以内        | 土壌灌注 | 4回以内<br>(移植前の土壌混<br>和は1回以内、移<br>植前の土壌灌注は<br>2回以内、本田で<br>は1回以内) |
|            |  | 300倍         | 育苗箱(30×<br>60×3cm、使<br>用土壌約5<br>L)1箱当り<br>500mL      |              |                 |      |  |
|            | 苗立枯病<br>(フザリウム菌)<br>苗立枯病<br>(ピシウム菌)<br>ムレ苗防止 | 250～<br>300倍 | 育苗箱(30×<br>60×3cm、使<br>用土壌約5<br>L)1箱当り<br>500mL      |              |                 |      |  |
|            |  | 500～<br>600倍 | 育苗箱(30×<br>60×3cm、使<br>用土壌約5<br>L)1箱当り<br>500～1000mL |              |                 |      |  |

【 変更後 】

| 作物名        | 適用病害虫名<br>使用目的                               | 希釈<br>倍数     | 使用液量  | 使用時期         | 本剤の<br>使用<br>回数 | 使用方法 | ヒドロキシノキザールを<br>含む農薬の総使用<br>回数                     |
|------------|--|--------------|---|--------------|-----------------|------|---|
| 稲<br>(箱育苗) | 根の生育促進<br>移植時の発根<br>及び活着促進                   | 500～<br>600倍 | 育苗箱(30×<br>60×3cm、使<br>用土壌約5<br>L) 1箱当り<br>500～1000mL | は種時及<br>び発芽後 | 2回<br>以内        | 土壌灌注 | 3回以内<br>(移植前の土壌混<br>和は1回以内、移<br>植前の土壌灌注は<br>2回以内) |
|            |  | 300倍         | 育苗箱(30×<br>60×3cm、使<br>用土壌約5<br>L) 1箱当り<br>500mL      |              |                 |      |   |
|            | 苗立枯病<br>(フザリウム菌)<br>苗立枯病<br>(ピシウム菌)<br>ムレ苗防止 | 250～<br>300倍 | 育苗箱(30×<br>60×3cm、使<br>用土壌約5<br>L) 1箱当り<br>500mL      |              |                 |      |   |
|            |  | 500～<br>600倍 | 育苗箱(30×<br>60×3cm、使<br>用土壌約5<br>L) 1箱当り<br>500～1000mL |              |                 |      |   |

【 申請者による変更理由 】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。