

2026年版

花き優良品種カタログ

夏秋スプレーギク サザンシリーズ

5～9月出し電照栽培に適する夏秋スプレーギク



サザングレイス

【R7】品種登録第30794号

花	色	花	型	季	咲	き
季	咲	き	開	花	期	
白	白	セ	ミ	ダ	ブ	ル
6	月	上	旬			

到花週数

コメ

8月出し

7週

花色は白色で低温期の作型でもアントシアニンの発色はほとんどない。5～9月出しいずれの作型でも到花週数が7週程度と安定している（5月出しは、幼弱性が強いいため到花週数が7.5～8週になる場合がある）。花型はセミダブル（半八重咲き）で輪数は付きやすい。

- ※ 栽培データは、南さつま市のものです。
- ※ 登録品種及び登録出願中の品種は、初回購入時に許諾契約先(裏表紙の種苗注文に関する問合せ先)との 契約(覚書)と利用料の納入が必要です。

夏秋スプレーギク サザンシリーズ

本県の気候風土に適し、暑さに強く、無シェードで計画的な出荷が可能な「サザンシリーズ」を育成しています。また、暖房コストの低減ができる、5月出しの夏秋スプレーギク活用が注目されています。

5月出し栽培が可能な4品種(新品種サザングレイスも含みます)



サザンサマーピンク

【H29】品種登録第26535号



サザンチェルシー

【H20】品種登録第17847号



サザンチェルシーイエロー

【H29】品種登録第26523号

品 種 名	花 色		花 型	季咲き 開花期	到花週数 8月出し	コ メ ン ト
	季咲き	8月 出し				
サザンサマーピンク	濃桃	薄桃	シングル	5月下旬	7.5週	花は薄桃色で緑心。草丈伸長性に優れ、草姿が安定。季咲き、5、6月出し栽培では、花色が濃い桃色になる。
サザンチェルシー	桃	薄桃	シングル	6月中旬	8.5週	幅広い作型で栽培しやすい。立葉で葉色が濃く草姿が良い。5、6月出し栽培では、花色がやや濃い
サザンチェルシー イエロー	黄	黄	シングル	5月下旬	8.5週	小葉・立葉で草丈や開花そろいが良く、草姿が良い。季咲き、5、6月出し栽培では、花卉にアントシアニン色素が発現

※ 栽培データは、指宿地域のものです。

※ 登録品種及び登録出願中の品種は、初回購入時に許諾契約先(裏表紙の種苗注文に関する問合せ先)との契約(覚書)と利用料の納入が必要です。

5月出しに向けた栽培管理例

		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
5月出し 本ぽハウス栽培例					(注) 定植 無加温 (低温地域では7~8℃の加温)	消灯	ピピフル処理(必要に応じて) 15℃程度加温 (暖房コストと収穫時期を考慮)	切り花収穫
母株ハウス栽培例	5月出し向け	定植	無加温 (低温地域では5℃の加温)	5月出し用 採穂				
	季咲き以降向け		定植	(低温地域では5℃加温) 無加温	6月出し用 採穂	7~8月出し用 採穂	9月出し用 採穂	



サザンペガサス

【H21】品種登録第19102号



サザンプラム

【H24】品種登録第22336号



サザンサマーホワイト

【R04】出願中(出願第35256号)

待望の
新品種

品 種 名	花 色		花 型	5月 出し 適性	季咲き 開花期	到花週数 8月出し	コ メ ン ト
	季咲き	8月 出し					
サザンペガサス	白	白	シングル	×	6月中旬	8.0週	純白で葉形が良く、莖葉にボリュームがある。季咲き、5、6月出し栽培では、花弁にアントシアニン色素が発現
サザンプラム	濃桃	濃桃	シングル	×	7月上旬	8.0週	高温期でも花弁の退色が少なく、莖葉のボリュームがある
サザンサマー ホワイト	白	白	シングル	×	5月下旬	7.5週	純白で緑心。花色以外はサザンサマーピンクと同じ特性。季咲き、5、6月出し栽培では、花弁にアントシアニン色素が発色

※ 栽培データは、指宿地域のものです。

※ 登録品種及び登録出願中の品種は、初回購入時に許諾契約先(裏表紙の種苗注文に関する問合せ先)との契約(覚書)と利用料の納入が必要です。

※ 種苗注文に関するお問合せは

- ◆ 鹿児島県経済農業協同組合連合会
(お近くのJA)
- ◆ 鹿児島県花卉園芸農業協同組合
- ◆ 鹿児島園芸花市場
- ◆ 沖永良部花き専門農業協同組合

の担当者へ御連絡ください。

※ 栽培技術等に関するお問合せは

- ◆ フラワーセンター
- ◆ 農業開発総合センター花き研究室
- ◆ お近くの支庁・地域振興局 農政普及課 (農業普及課)

の担当者へ御連絡ください。