

(6) なたね

早晩性	品 種 名	来 歴	採 用 年 度	播 種 期	抽 苔 期	開 花 期	成 熟 期	草 丈	穂 長	第 一 数 次 分 枝	総 分 枝 数	花 形	寒 害	品 質	含 油 率	子 実 千 粒 量	子 実 一 粒 重	10 子 a 当 たり 量	耐病性				適 地	特 性 概 要	備 考
																			菌 核 病	白 さ び 病	黒 竹 病	黒 斑 菌 性 病			
早	オオミナタネ	チサヤナタネ ／東海8号 (東海近畿農試育成)	昭和 43	月.日 10.23 (12.1)	月.日 2.20 (1.26)	月.日 3.7 (2.27)	月.日 5.11 (5.13)	cm 168 (123)	cm 45.5 (45.3)	本 11.6 (17.5)	本 — (51.8)	Ⅱ	強	中 (上)	% 40.8	g (3.4)	g (652)	kg 403 (242)	やや強	中	強	中	県下全域	早生, 多分枝, 耐病 性強, 多収	【農業試験場本場 (現農業開発総合センター)及び 大隅支場成績】 直播栽培 (平成10～20年(H13除く)) 移植栽培 (昭和39～43年)

注) 上段は直播栽培 (大隅支場特性検定試験成績より, 平成10～20年(H13除く))
下段は移植栽培 (農業試験場本場, 昭和39～43年), 播種期の下段 () 書きは移植期