（２）さつまいも適品種特性表

「適品種」とは，用途が限定され普及見込みが小さいなど「奨励品種」として条件を満たさないものの，特徴ある品種特性を有することから，本県農業，関連企業，農家の発展に寄与する可能性がある品種として，さつまいも適品種選定協議会で選定したものである。

| 区分 | 品種名 | 来歴 | 採用年度 | 萌芽性 | 育苗難易 | 挿苗期 | いもの 形 | いもの 形の整否 | いもの 皮色 | いもの 肉色 | いもの 条溝 | いもの 外観 | 掘取の難易 | 貯蔵性 | いも個数 | 一個重 | 上いも重 | 切干歩合 | でん粉歩留 無水 | でん粉歩留 水分18% | でん粉粒径 | 基腐病 | 黒斑病 | かいよう病 | コウガネセンガン | ナウセンネチュウ | 適地 | 特性概要 | 備考（大隅支場成績） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 月・日 | | | | | | | | | 個/株 | g | t/10a | % | % | % | u | | | | | | | | |
| 焼酎用 | ジョイホワイト | 九州７６号／九州８９号（九州沖縄農研育成） | 平成7 | 中 | 中 | 4.18<br>5.20 | 紡錘 | やや整 | 白 | 白 | 微 | やや上 | 易 | やや易 | 3.6<br>3.7 | 299<br>245 | 2.95<br>2.52 | 37.4<br>35.1 | 23.0<br>22.7 | 28.0<br>27.7 | － | やや強 | 中 | － | 強 | やや強 | 加工用契約地帯 | 焼酎醸造性が高い，収量がコガネセンガンに比べやや劣る，でん粉歩留が高い | 上段 早掘マルチ 平成24～令和3年（令和2年除く）<br>下段 普通掘裸地 平成22～令和元年 |
| 加工用 | アヤムラサキ | 九州１０９号／サツマヒカリ（九州沖縄農研育成） | 平成7 | 中 | 中 | 4.23<br>5.26 | 長紡錘 | やや整 | 暗赤紫 | 濃紫 | 無 | やや上 | やや易 | やや易 | 3.1<br>3.9 | 171<br>167 | 1.86<br>2.32 | 35.7<br>37.3 | 19.8<br>21.9 | 24.1<br>26.7 | － | 中 | 中 | － | やや強 | 中 | 加工用契約地帯 | アントシアニン（紫色）の色価が高く，色素利用品種，貯蔵性やや易 | 上段 早掘マルチ<br>下段 普通掘裸地 平成22～令和元年 |
| | ジェイレッド | シロユタカ／８６J－６（九州沖縄農研育成） | 平成9 | 中 | 中 | 4.23<br>5.26 | 紡錘 | 整 | 淡赤褐 | 橙 | 無 | やや上 | 易 | やや易 | 3.3<br>3.4 | 139<br>178 | 1.63<br>2.18 | 31.6<br>27.6 | 17.9<br>15.2 | 21.8<br>18.5 | － | － | やや弱 | － | 強 | やや強 | 加工用契約地帯 | 飲料原料用品種，βカロチンが多く，搾汁率が高い，収量は安定して多収 | 上段 早掘マルチ<br>下段 普通掘裸地 平成22～令和元年 |
| 青果・加工用 | べにまさり | 九州１０４号／九系87010-21（九州沖縄農研育成） | 令和4 | やや良 | やや易 | 4.27<br>4.30 | 短紡錘 | やや整 | 紫赤 | 黄白 | 微 | やや上 | 易 | やや易 | 3.2<br>3.4 | 187<br>180 | 2.07<br>2.23 | 33.5<br>33.9 | 20.4<br>21.7 | 24.1<br>25.6 | － | やや強 | やや強 | － | 中 | 中 | 県下全域 | 早掘り適性がある | 上段 早掘マルチ 平成10～14年，令和４，５年<br>下段 普通掘 平成10～平成13年（裸地），令和４，５年（マルチ） |