区分	品種名	来歴	採用年度	萌芽性	挿苗期	いもの 形	いもの 形の整否	いもの 皮色	いもの 肉色	いもの 条溝	いもの 外観	しょ梗の強さ	貯蔵性	いも個数	一個重	上いも重	切干歩合	でん粉歩留 無水	でん粉歩留 水分18%	基腐病	黒斑病	かいよう病	センチュウ ネコブ	センチュウ ネグサレ	適地	特性概要	備考（大隅支場及び園芸作物部成績）
					月・日									個/株	g	t/10a	%	%	%								
でん粉用	シロユタカ	九州708－13／ Ｓ684－６ （九州沖縄農研育成）	昭和60	良	4.19 5.20	紡錘	中	白（帯紅）	白	中（浅）	中	やや弱	やや易	4.3 3.9	330 305	3.65 3.26	35.6 33.7	24.2 22.4	29.5 27.4	中	強	弱	強	やや強	本土全域 熊毛地域	萌芽性すぐれ育苗易	上段 早掘マルチ 平成27～令和６年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
でん粉用	シロサツマ	ＣＳ69136－２／ タマユタカ （作物研究所育成）	昭和61	良	4.18 5.20	短紡錘	やや整	淡黄白	淡黄白	浅	やや上	－	易	4.4 3.3	299 272	3.62 2.49	35.2 33.0	21.8 21.5	26.6 26.3	やや弱	やや強	やや弱	強	やや強	本土全域 熊毛地域	萌芽性すぐれ育苗易， 貯蔵性易	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
でん粉用	ダイチノユメ	九系117／ ハイスターチ （九州沖縄農研育成）	平成15	中	4.18 5.20	紡錘～長紡錘	やや整	白	淡黄白	極浅	やや上	弱	やや易	5.6 5.3	288 242	4.40 3.49	38.2 37.9	25.0 25.6	30.5 31.2	弱	やや弱	中	強	やや強	本土全域 熊毛地域	でん粉歩留が高い いも個数多い	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
でん粉用	こないしん	九州162号／ 九系04136－16 （九州沖縄農研育成）	平成30	中	4.19 5.21	短紡錘	やや整	茶橙	黄白	微	やや上	やや強	易	5.5 5.6	329 248	4.66 3.89	35.5 35.7	24.2 24.4	29.5 29.8	やや強	やや弱	中	強	やや強	本土全域 熊毛地域	つる割病やや強，多収 でん粉白度高い 貯蔵性易，萌芽性中	上段 早掘マルチ 平成26～令和５年 下段 普通掘裸地 平成26～令和元年
でん粉・焼酎用	みちしずく	九系320／ 九系09187－14 （九州沖縄農研育成）	令和３	やや不良	4.20 5.18	紡錘形	やや整	黄白	黄白	少	やや上	やや弱～中	やや易	6.2 6.3	302 256	5.06 4.47	37.0 36.9	26.4 26.1	32.2 31.8	やや強	中	やや強	強	やや強	本土全域 熊毛地域	多収，でん粉歩留が高い貯蔵性やや易	上段 早掘マルチ 令和元～令和６年 下段 普通掘マルチ 令和元～令和６年
でん粉・焼酎用	コガネタイガン	九系330／ 九系11084-2 （九州沖縄農研育成）	令和６	良	4.19 5.20	紡錘形	やや整	黄白	淡黄白～黄白	浅	やや上	中	易	5.7 6.1	302 279	4.40 4.26	35.3 35.3	25.2 25.3	30.7 30.9	強	－	－	強	やや強	本土全域 熊毛地域	多収，基腐病抵抗性強，萌芽性すぐれ育苗易，ネコブセンチュウ抵抗性強，ネグサレセンチュウ抵抗性やや強	上段 早掘マルチ 令和３～令和７年 下段 普通掘マルチ 令和３～令和７年

区分	品種名	来歴	採用年度	萌芽性	挿苗期	いもの 形	いもの 形の整否	いもの 皮色	いもの 肉色	いもの 条溝	いもの 外観	しょ梗の強さ	貯蔵性	いも個数	一個重	上いも重	切干歩合	でん粉歩留 無水	でん粉歩留 水分18%	基腐病	黒斑病	かいよう病	センチュウ ネコブ	センチュウ ネグサレ	適地	特性概要	備考（大隅支場及び園芸作物部成績）
					月・日									個/株	g	t/10a	%	%	%								
焼酎・加工用	コガネセンガン	鹿系7－120／ Ｌ－４－５ （九州沖縄農研育成）	昭和42	中	4.18 5.20	下膨紡錘	中	黄白	淡黄	多（深）	中	やや弱	やや難	4.5 4.2	303 224	3.72 2.55	36.6 34.3	23.6 22.6	28.8 27.6	やや弱	弱	やや強	やや弱	弱	県下全域	いもの揃いが良い 蒸しいもの香味が良い 貯蔵性やや難 粉質で食味が良い	上段 早掘マルチ 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
加工用	高系１４号	ナンシーホール／ シャム （高知県農試育成）	昭和34	やや不良	4.23 5.26	紡錘	整	淡紅	黄白	少（浅）	やや上	弱	易	3.3 3.2	166 188	1.81 1.75	34.9 31.9	21.2 20.9	24.9 ~~25.5~~	やや弱	弱	弱	やや弱	強	県下全域	耐病性が劣るが全作型に向き作りやすい。加工時の肉色の変色が少ない	上段 早掘マルチ 平成26～令和５年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年

区分	品種名	来歴	採用年度	萌芽性	挿苗期	いもの 形	いもの 形の整否	いもの 皮色	いもの 肉色	いもの 条溝	いもの 外観	しょ梗の強さ	貯蔵性	食味 肉質	食味 食味	いも個数	一個重	上いも重	基腐病	黒斑病	帯状粗皮病	かいよう病	センチュウネコブ	センチュウネグサレ	適地	特性概要	備考（大隅支場及び園芸作物部成績）
					月・日											個/株	g	t/10a									
青果用	高系１４号（ベニサツマ）	ナンシーホール／シャム（高知県農試育成）	昭和34	やや不良	4.23 5.26	紡錘	整	紫紅	黄白	少（浅）	やや上	弱	易	中	上	3.3 3.5	171 184	2.01 2.26	やや弱	弱	弱	弱	やや弱	強	県下全域	外観，食味とも良い，耐病性が劣るが全作型に向き作りやすい（ベニサツマは高系１４号の選抜系統）	上段 早掘マルチ 平成27～令和６年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
	コガネセンガン	鹿系７－120／Ｌ－４－５（九州沖縄農研育成）	昭和42	中	4.23 5.26	下膨紡錘	中	黄白	淡黄白	多（中）	中	やや弱	やや難	粉	上	4.0 3.4	118 133	1.68 1.63	やや弱	弱	やや強	やや強	やや弱	弱	県下全域	形状がくずれやすい，食味が良い	上段 早掘マルチ 平成27～令和６年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年
	べにはるか	九州121号／春こがね（九州沖縄農研育成）	平成17	中	4.23 5.26	紡錘	整	紫紅	黄白	微	やや上	弱	易	粘	上	4.0 5.0	127 151	1.81 2.70	弱	中	やや弱	やや弱	強	やや強	県下全域	個数やや多く，形状良い。収穫直後はやや粉質だが，貯蔵することで粘質に変わり，甘みが強く，食味が良くなる。貯蔵期間が長くなると，粘質程度が強くなる。ヤラピンが多い。	上段 早掘マルチ 平成27～令和６年 下段 普通掘裸地 平成22～令和元年