

早期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（５月）

(No.1) 調査年月日：2025年 5月 12～ 22日

生 育 ステージ	分げつ期～節伸

病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率（％）		程度別発生ほ場率（％）															記 事
					本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
○ いもち病	並	並	薩 摩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			熊 毛	0	0	3					100	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	
			県 計	0	0	0.5					100	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
○ 紋枯病	並	並	薩 摩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
萎縮病	並	並	薩 摩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
縞葉枯病	並	並	薩 摩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ばか苗病	並	多	薩 摩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	有明町：少1
			大 隅	247	14	0				14	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	247	6	0				6	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

栽培面積： 薩摩 1,480 ha 大隅 1,730 ha 熊毛 650 ha 平年は2015～2024の平均値。

注１）「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注２）「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

薩 摩： 南九州市顚娃町御領（２）、南さつま市加世田益山（２）・大浦町干拓（２）・金峰町田布施（２）、日置市日吉町吉利（２）・吹上町上田尻（２）・・・調査ほ場数：12ほ場

大 隅： 志布志市有明町野井倉（２）、大崎町横瀬（２）、鹿屋市串良町有里（２）・吾平町上名（２）、東串良町川東（２）、肝付町後田（２）、錦江町田代川原（２）・・・調査ほ場数：14ほ場

熊 毛： 中種子町 熊野（２）、南種子町 平山（２）・・・調査ほ場数：4ほ場

県 計 ・・・巡回調査地点数：15地点（うち病虫害防除員調査分：熊毛２地点）、調査ほ場数：30ほ場

生育 ステージ	分げつ期～節伸
------------	---------

病害虫名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)		程度別発生ほ場率 (%)															記 事
					本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ツマク・ロコハ・イ	やや少	やや少	薩 摩	0	0	10					100	14	14	0	0	21	0	0	14	14	23	田代:少1
			大 隅	124	7	14				7	93	14	36	7	0	21	0	7	7	14	31	
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	124	3	10				3	97	12	22	3	0	17	0	3	8	12	23	
ヒメトビ・ウナ	並	並	薩 摩	0	0	1					100	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	0	0	0					100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
セシ・ロウナ	やや少	やや少	薩 摩	0	0	12					100	36	29	0	0	0	0	7	0	0	46	
			大 隅	0	0	10					100	14	21	0	0	0	0	14	0	0	54	
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	0	0	9					100	19	20	0	0	0	0	9	0	0	42	
トビ・イロウナ	並	並	薩 摩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
フナトビ・コヤカ	並	並	薩 摩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	1					100	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	
			熊 毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	0	0	1					100	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	

注2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生度を加味して評価したものである。

薩摩	南九州市額賀町御領（２）、南さつま市加世田益山（２）・大浦町干拓（２）・金峰町田布施（２）、日置市日吉町吉利（２）・吹上町上田尻（２）・・・調査ほ場数：12ほ場
大隅	志布志市有明町野井倉（２）、大崎町横瀬（２）、鹿屋市串良町有里（２）・吾平町上名（２）、東串良町川東（２）、肝付町後田（２）、錦江町田代川原（２）・・・調査ほ場数：14ほ場
熊本	毛：中種子町 熊野（２）、南種子町 平山（２）・・・調査ほ場数：4ほ場
県計	・・・巡回調査地点数：15地点（うち病害虫防除員調査分：熊毛２地点）、調査ほ場数：30ほ場