2025年(令和7年)5/12~22日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生 面積	発生ほ場率 (%)		多	生程度 (%)	年次別 発生ほ場率 (%)												病・発生 %,頭,枚			備 考	
	19A pT			(ha)	本年	平年	甚多	中少	無	' 15	' 16	' 17	' 18	' 19	' 20	' 21	' 22	' 23	' 24			本年	評価	平年	
		やや少	南薩	1, 444	31	54		31	69	69	69	25	44	31	59	47	88	47	63	1 ㎡当り	南薩	0.5	やや少	(6.1)	少: 頴娃(谷場) 1, 知覧(菊永) 1,
〇 炭疽病	やや少	やや少	北薩	592	40	57		40	60	50	70	50	70	20	10	50	90	90	70	病葉数	北薩	2. 1	並	(1.6)	知覧(後岳) 1,川辺1,加世田1, さつま1,溝辺1,牧園1,湧水
	424279	やや少	大隅	243	13	29		13	88	38	13	0	25	38	13	25	63	25	50		大隅	0.3	やや少	(0.6)	1, 有明(野井倉)2
		やや少	県計	2, 279	28	48		28	72	57	55	23	44	31	39	42	82	50	61		県平均	0.9	やや少	(3.5)	
	やや少	やや少	南薩	0	0	5			100	6	0	0	13	0	0	0	12	0	19	1 m²当り	南薩	0.0	並	(0.1)	
○ 輪斑病		やや少	北薩	0	0	11			100	10	0	10	0	0	0	0	40	20	30	病葉数	北薩	0.0	並	(0.1)	
〇 輔灰70	1-1-9	並	大隅	0	0	5			100	13	0	0	0	0	0	0	38	0	0		大隅	0.0	並	(0.5)	
		やや少	県計	0	0	6			100	9	0	2	7	0	0	0	23	4	16		県平均	0.0	並	(0.2)	
		並	南薩	0	0	1			100	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 ㎡当り	南薩	0.0	並	(0.0)	
もち病	並	並	北薩	0	0	4			100	0	30	0	10	0	0	0	0	0	0	病葉数	北薩	0.0	並	(0.0)	
0 97M	邓	並	大隅	0	0	1			100	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.1)	
		並	県計	0	0	1			100	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0		県平均	0.0	並	(0.02)	

2025年(令和7年)5/12~22日調査

米樹 州吉里		示地區		発生	発生 1	ま場率			:程度	:		年次別 発生ほ場率										2020-		ロイ ー) 病・発生		22 H B	<u> </u>	
病害虫名	総合概評	概評	地域	面積	(%		光生性及 (%)					(%)												M · 光王 %,頭,枚			備 考	
	19A.pT			(ha)	本年	平年	甚	多	中	少	無	' 15	' 16	' 17	' 18	' 19	' 20	' 21	' 22	' 23	' 24			本年	評価	平年		
		並	南薩	866	19	14				19	81	13	19	0	0	6	6	29	12	29	25	1 ㎡当り	南薩	0.4	多	(0.1)		
○ チャノコカク モンハマキ	並	少	北薩	0	0	24					100	30	40	0	20	20	0	20	30	20	60	虫数	北薩	0	やや少	(0.2)	中: 鹿屋 2	
[○] モンハマキ	412.	やや多	大隅	485	25	20			25		75	25	13	13	13	25	25	25	38	13	13		大隅	2.8	多	(0.3)	少:枕崎1,伊集院2	
		並	県計	1, 352	17	17			6	11	83	19	21	3	7	13	10	27	21	24	28		県平均	0.9	多	(0.2)		
		やや多	南薩	1, 155	25	16			6	19	75	13	19	6	19	0	6	29	24	18	31	1 ㎡当り	南薩	1. 1	多	(0.5)		
○チャハマキ	並	やや少	北薩	0	0	13					100	20	20	0	10	10	0	0	20	30	20	虫数	北薩	0.0	やや少	(0.1)	中:枕崎1 少:頴娃(谷場)1・頴娃(青戸)1,	
0) 4 / 1 4 4	<u>MV.</u>	少	大隅	0	0	14					100	25	13	0	13	13	13	13	25	13	13		大隅	0.0	やや少	(0.3)	夕.頑妊(骨笏/1°頑妊(目尸/1, 枕崎 1	
		並	県計	1, 155	14	15			4	11	86	17	17	4	16	5	7	20	23	19	25		県平均	0.5	やや多	(0.3) (0.2) (0.01) (0.1) (0.1) (1.2) (1.2) (2.0) (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) (1.5) (1.6	20.13	
		並	南薩	578	13	9				13	88	0	6	19	19	6	0	24	6	0	6	1㎡当り 南薩	0	並	(0.2)			
○チャノホソガ	多	やや多	・北薩	592	40	25				40	60	0	30	20	40	20	10	40	20	40	30	巻葉数	北薩	0.6	多	(0.01)	少:知覧(菊永)1,伊集院1,出水	
	多	多	大隅	728	38	9				38	63	0	0	38	0	13	0	0	0	25	13		大隅	1	多	(0.1)		
		多	県計	1,898	24	12				24	76	0	9	24	18	10	2	21	7	13	12		県平均	0.56	多	(0.1)	. 1 , 200 = 2	
		多	南薩	3, 755	81	59				81	19	25	56	56	75	50	65	59	53	71	81	4ヶ所叩き	南薩	1.4	並	(1.2)		
ジェノョコバイ 多 並 大隅 1,456 75 68 25 50 25 75 63 75 63	Et .	やや少	北薩	592	40	63				40	60	90	60	20	50	60	90	70	60	60	70	落とし虫数	北薩	1.0	並	(2.0)		
	63	50	38	88	50	88	88		大隅	4.6	多	(1.5)	,川辺2,加世田1,枕崎2,伊集院1,出水 2 牧園1 酒水1有明(野共食)2 有明(原															
		やや多	県計	5, 802	72	62			6	66	28	49	58	54	67	52	62	68	54	73	81		県平均	2. 1	やや多	(1.5)		
	*	並	南薩	2, 599	56	43				56	44	63	88	75	50	50	18	29	12	35	13	4ヶ所叩き	南薩	2.6	やや少	(9.7)	小、短柱(公县)1. 知覧(遊永)1 知	
。チャノキイロ		やや少	北薩	592	40	60				40	60	100	90	50	70	80	50	40	40	30	50	落とし虫数	北薩	1. 9	やや少	(11. 2)	覧(後岳) 2, 川辺 2, 加世田1, 枕崎	
○ アザミウマ	並	多	大隅	1, 456	75	58				75	25	50	63	75	63	63	50	25	63	63	63		大隅	2. 1	並	(1.2) 中: 錦江2 少: 頴娃(谷場) 1・頴娃(青戸) 2, 知 え) 2, 知覧(後岳) 2, 加世日1, 枕崎2, 伊集院 2, 牧園1, 湧水1有明(野井倉) 2, り(1.5) 世) (1.5) 世) (1.5) 世) (9.7) 少: 頴娃(谷場) 1・知覧(菊永) 覧(後岳) 2, 川辺2, 加世日1 (2.7) は(後岳) 2, 川辺2, 加世日1 (2.7) は(野井倉) 2, 鹿屋2, 錦江2 り(8.5) 中: 牧園1, 末吉2	1, 伊集院1, 出水2, 牧園1, 有明	
		並	県計	4, 647	58	50				58	42	66	82	70	57	59	31	30	29	41	31		県平均	2.3	やや少	(8.5)	(野井倉)2, 鹿屋2, 錦江2	
_		並	南薩	866	19	18				19	81	19	6	25	38	44	6	0	18	12	13	寄生葉率	南薩	0.3	やや少	(6. 3)		
	37.	並	北薩	740	50	51			30	20	50	20	20	100	60	80	80	10	40	60	40		北薩	5. 9	並	(8.4)		
カンザワハダニ	並	並	大隅	485	25	19				25	75	13	25	25	63	13	0	13	25	0	13		大隅	0	やや少	(5. 3)		
		並	県計	2, 092	26	24	†		6	20	74	17	13	39	48	43	17	5	24	18	18		県平均	2.0	やや少	や少 (9.7) や少 (11.2) 覧(後岳) 2, 川辺2, ガ に (2.7) に (8.5) や少 (8.5) に (8.4) や少 (5.3) に (8.8) や少 (6.8) に (2.3) 中: 牧園1, 末吉2 少: 知覧(後岳)1, 川に 1, 湧水1, 有明(原田 で少 (6.8) 中: 株園 1, 東西 1, 湧水1, 有明(原田	.1, 扬小1, 有机体四/1, 胚座1	
		やや多	南薩	1, 155	25	17				25	75	6	6	13	0	13	24	29	12	29	38	1 ㎡当り	南薩	1. 0	並	(2.3)	中 昨日1	
ツマグロアオ	£	やや多	北薩	444	30	14				30	70	10	0	10	0	10	10	0	10	40	50	被害芽数	北薩	3. 5	やや多	(1.4)	中:庭庠 I 少:頴娃(谷場) 1・頴娃(青戸) 1 ,	
カスミカメ	多	多	大隅	728	38	11			13	25	63	13	0	25	0	0	38	0	13	25	0		大隅	4. 6	多	(0.5)	川辺1, 枕崎1, 出水1, 末吉2,	
		多	県計	2, 327	29	15	†		3		71	9	4	15	0	9	25	17	12	30	31		県平均	2. 6	並	(1. 6)	有明(野井倉)1,有明(原田)1	
		-	南薩	578	13	_				13	88	-	_	-	_	_	_	_	_	53	19	寄生葉率		0. 4	_	-	# ++ 0	
		_	北薩	592	40	_			20	20	60	-	_	_	_	_	_	_	_	70	50				_	中:末吉2 少:加世田2,溝辺2,牧園1,湧		
チャトゲコナジラミ	_	_	大隅	485	25	_					75	_	_	_	_	_	_	_	_	63	25		大隅	4. 5	L = \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		水1, 錦江2	
		-	県計	1,655	21	_	 		4		79	_	_		_	-		_	-	58	26		県平均	3. 5	-	_		
※その他特記事項	1		NINHI	1,000	21				1	11										00	20		214 1 - 60	0.0				

※その他特記事項

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年(令和7年)5/12~22日調査

	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生 面積	発生ほ場(%)	易率	発	生程度 (%)				年次		発生ほ場 %)	計率					·病・発生 (%, 頭, セ			備	考	
		13/101			(ha)	本年	平年 甚	多	中少	無	' 15	'16 '1	7 '18	' 19	'20	'21 '	22 '	23 24	:		本年	評価	平年			
	南薩:薩摩中南西部 4	, 576ha		8地点1	6ほ場 【	南九州市潁	娃町牧之	7内(谷場	i)②・頴娃	町上別	府(青戸						多岳) ②)・川辺町	下山田(塘	池)②】						
【南さつま市加世田内山田(東山)②,枕崎市別府(中原)②,日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】																										
	北薩:川内川中流域・霥	§島山麓	1, 477ha	6地点	10ほ場 【	【さつま町船	沐(舟木)	②,出	水市平和町	②,霧.	島市溝	辺町麓(論	i地)②,	霧島市物	牧園町三	体堂①	,湧水	:町木場①	,曽於市	卡吉町岩	·崎②】			 		
		20ha		4地点	8ほ場 【	志布志市有	明町野井	: 倉②・7	有明町原田	②, 鹿	屋市東	原町②,釒	帛江町城	元②】										 		
	県計(熊毛・大島除く)	7, 9731	ha (R5)	18地点3	4ほ場																			 		

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。