

果樹 病害虫発生予察巡回調査月報
【カンキツ】

令和7年8月12日～20日調査

掲載	病害虫名	総合概評	概評	品種・地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)				備考 発生確認地点（下線は多・甚）
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24		本年	評価	平年	
そうか病 春葉	やや多	多	温州	284	38	7					38	63	13	0	0	0	0	20	10	10	10	10	温州	0.6	多	(0.1)	市来:少1, 加世田:少1, 出水:少1
		並	甘夏	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)	
		並	その他中晩柑	0	0	3					100	0	0	16	4	0	0	6	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(0.1)	
		多	本土・熊毛	284	13	4					13	87	2	0	11	3	0	7	8	4	4	3	本土・熊毛	0.2	やや多	(0.1)	
そうか病 果実	やや多	多	温州	473	63	10					63	38	13	0	0	13	0	0	30	10	20	10	温州	0.9	並	(0.7)	市来:少2, 加世田:少1, 出水:少1, 霧島:少1
		並	甘夏	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)	
		並	その他中晩柑	0	0	1					100	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(0.0)	
		多	本土・熊毛	473	22	4					22	78	2	0	0	3	0	0	19	4	7	3	本土・熊毛	0.2	並	(0.2)	
〇かいよう病 春葉	並	多	温州	473	63	27					63	38	0	50	38	63	25	0	30	0	30	30	温州	1.1	並	(1.1)	市来:少2, 加世田:少1, 出水:少1, 霧島:少1
		やや多	甘夏	329	100	77					100		100	100	100	75	63	70	80	90	40	50	甘夏	5.0	並	(4.8)	
		やや少	その他中晩柑	91	8	19					8	92	44	44	41	21	17	0	6	6	13	0	その他中晩柑	0.1	やや少	(0.8)	
		やや多	本土・熊毛	893	41	29					41	59	41	50	45	40	28	7	23	15	22	18	本土・熊毛	2.0	並	(1.7)	
〇かいよう病 果実	並	並	温州	95	13	14					13	88	0	13	38	25	13	0	20	10	20	0	温州	0.1	やや少	(0.5)	加世田:少1
		やや多	甘夏	296	90	65				10	80	10	100	100	75	75	38	50	80	70	10	50	甘夏	7.9	並	(5.5)	
		やや少	その他中晩柑	91	8	36					8	92	53	47	47	42	4	13	63	44	50	0	その他中晩柑	0.1	やや少	(1.4)	
		やや少	本土・熊毛	482	22	34				2	21	78	48	45	48	45	13	13	51	35	34	7	本土・熊毛	2.7	やや多	(1.8)	
〇黒点病	少	やや少	温州	284	38	66					38	63	100	88	100	100	50	90	50	30	20	30	温州	0.4	やや少	(24.4)	加世田:少1, 出水:少2
		やや少	甘夏	0	0	33						100	100	100	25	63	0	40	0	0	0	0	甘夏	0.0	やや少	(3.4)	
		少	その他中晩柑	91	8	36					8	92	34	50	44	29	8	19	50	63	44	17	その他中晩柑	0.2	やや少	(3.9)	
		少	本土・熊毛	375	17	41					17	83	52	61	52	50	15	43	44	43	29	19	本土・熊毛	0.2	やや少	(7.7)	
赤衣病	－	－	温州	0	0	0						100						0	0	0	0	0	※発生の有無のみ	－	－	－	
		－	甘夏	0	0	0						100						0	0	0	0	0		－	－	－	
		－	その他中晩柑	0	0	37						100						38	31	50	25	42		－	－	－	
		－	本土・熊毛	0	0	20						100						22	17	26	13	21		－	－	－	
〇ミカンハダニ	やや多	やや多	温州	473	63	47	13				50	38	63	63	25	88	38	20	30	40	50	50	温州	16.1	やや多	(8.9)	霧島:甚1, 市来:少2, 吹上:少1, 出水:少1,
		並	甘夏	99	30	22	10				20	70	50	0	0	50	0	30	10	0	40	40	甘夏	10.8	多	(0.9)	
		やや少	その他中晩柑	91	8	16					8	92	31	22	34	29	13	6	6	13	0	8	その他中晩柑	0.4	やや少	(2.9)	
		並	本土・熊毛	662	30	25	6				25	70	39	27	30	45	15	13	14	20	23	27	本土・熊毛	8.1	多	(4.3)	
ミカンハモグリガ	並	やや多	温州	662	88	77	13			38	38	13	88	75	75	50	100	80	70	90	50	90	温州	21.9	－	－	甚(霧島:1), 中(市来1, 加世田1, 出水1), 少(市来1, 吹上1, 霧島1)
		やや少	甘夏	165	50	66			20	30		50	100	100	25	63	75	40	50	90	50	70	甘夏	12.6	－	－	
		やや少	その他中晩柑	637	58	77				33	25	42	100	88	81	83	96	69	69	63	69	50	その他中晩柑	4.6	－	－	
		やや少	本土・熊毛	1,463	67	76	4	3	34	26	33	98	86	75	73	93	69	67	76	60	67		本土・熊毛	11.9	－	－	

その他

●面積
県本土熊毛 2,177ha
温州 756ha
甘夏 329ha
その他中晩柑 1,092ha
※果樹生産統計資料(R4年度産実績)より

●調査ほ場数
温州8(南薩2,北薩2,日置2,始良2)
甘夏10(北薩10)
ボンカン4(熊毛4)
カンカン8(南薩4,熊毛4)

●その他病害虫
出水の露地温州でミナミトゲヘリカメムシの発生を確認(1園地:真鍋防除員)

●平年値:2015～2024年の10年間の平均値
●ミカンハモグリガは,2022年まで発生の有無のみ調査