

作物名	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)			発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)								発病・発生数 (%、頭、枚)				備考							
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	本年	前年		評価	平年					
カンキツ	そうか病 (春葉)	並	並	奄美	0	0	0	1					100	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100葉当り発病率	奄美	0.0	0.0	並	(0.04)	
カンキツ	そうか病 (果実)	並	並	奄美	0	0	14	3					100	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100果当り発病率	奄美	0.0	0.1	並	(0.04)		
カンキツ	かいよう病 (春葉)	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100葉当り発病率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)		
カンキツ	かいよう病 (果実)	やや多	多	奄美	127	29	14	11				29	71	43	14	0	0	0	0	14	14	14	14	14	100果当り発病率	奄美	0.3	0.1	やや多	(0.1)	奄美市名瀬：少2		
カンキツ	黒点病	やや少	やや少	奄美	0	0	14	4					100	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	14	100葉当り発病率	奄美	0.0	0.1	やや少	(0.1)			
カンキツ	ミカンハダニ	多	多	奄美	127	29	14	4				29	71	0	0	0	0	0	0	0	29	0	14	14	100葉当り寄生率	奄美	1.6	2.6	やや多	(0.6)	奄美市名瀬：少1 瀬戸内町：少1		
カンキツ	ミカンハモグリガ	やや多	やや多	奄美	317	71	57	51				71	29	0	0	57	100	43	43	71	86	57	57	57	100葉当り寄生率	奄美	4.4	0.7	多	(1.3)	奄美市名瀬：少2 奄美市住用：少1 瀬戸内町：少2		
カンキツ	赤衣病	-	-	奄美	127	29	-	-				29	71											14	10樹当り発病有無	奄美					奄美市名瀬1 奄美市住用1		

※その他特記事項  
 【カンキツ】  
 R7.8.19～20調査

●調査地点  
 カンキツ 443.3ha 【●その他中晩柑 :441.2ha (タンカン380.6ha, 津之輝29.0ha, ポンカン24.1ha, その他7.5ha) , ○温州みかん:2.0ha, ○なつみかん:0.1ha】 / 7ほ場調査【名瀬3, 住用2, 瀬戸内2】調査品目は全てタンカン

※ 栽培面積 カンキツ：「果樹生産統計資料（令和4年産実績）」（令和6年3月 県農産園芸課）から出典

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。