

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年（令和7年）8/12～25日調査

病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)				備 考	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	評価		平年
○ 炭疽病	並	やや多	南薩	2,888	63	53			6	56	38	63	25	38	44	44	76	65	47	65	63	1㎡当り	南薩	10.9	多	(4.0)	中：加世田1 少：穎娃(谷場)2, 知覧(後岳)2 , 川辺2, 加世田1, 伊集院2, さつま 1, 出水1, 溝辺1, 牧園1, 湧水1, 末吉 1, 有明(原田)1
		少	北薩	888	60	85				60	40	80	90	70	80	90	80	100	90	80	90	病葉数	北薩	6.2	やや少	(13.2)	
		やや少	大隅	485	25	41				25	75	25	75	13	38	13	63	75	50	25	38		大隅	2.9	並	(2.5)	
		並	県計	4,261	53	56			4	49	47	56	49	37	49	45	74	74	56	58	62		県平均	7.6	並	(6.3)	
輪斑病	並	並	南薩	1,733	38	33				38	63	50	6	50	13	13	59	35	29	29	44	1㎡当り	南薩	1.1	やや少	(2.7)	少：穎娃(谷場)2・穎娃(青戸)1, 知覧 (後岳)1, 加世田2, さつま1, 牧園1, 湧水1, 末吉1, 有明(原田)1
		やや少	北薩	592	40	56				40	60	40	70	50	50	50	70	50	60	40	80	病葉数	北薩	5.0	やや多	(3.1)	
		やや少	大隅	243	13	34				13	88	13	38	0	25	50	63	50	50	13	38		大隅	2.6	並	(2.5)	
		並	県計	2,568	32	37				32	68	39	26	38	22	29	62	42	40	27	49		県平均	2.6	並	(2.8)	
もち病	やや少	並	南薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0	並	(0)	
		やや少	北薩	0	0	7					100	20	0	30	0	0	20	0	0	0	0	病葉数	北薩	0	並	(0.3)	
		並	大隅	0	0	1					100	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0	並	(0.0)	
		やや少	県計	0	0	2					100	4	0	9	0	0	3	0	0	0	0		県平均	0	並	(0.1)	
○ 網もち病	やや少	並	南薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0	並	(0.02)	
		やや少	北薩	0	0	5					100	10	0	0	0	10	20	0	10	0	0	病葉数	北薩	0.0	やや少	(0.1)	
		並	大隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0	並	(0)	
		やや少	県計	0	0	1					100	2	0	0	0	2	3	0	2	0	0		県平均	0.0	やや少	(0.03)	
○ チャノコカク モンハマキ	やや少	やや少	南薩	0	0	6					100	6	0	0	25	6	6	0	12	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.3)	少：錦江1
		やや少	北薩	0	0	15					100	20	20	0	0	20	10	40	20	20	0	虫数	北薩	0.0	やや少	(0.6)	
		並	大隅	243	13	11				13	88	38	13	0	0	25	38	0	0	0	0		大隅	0.1	並	(0.5)	
		やや少	県計	243	3	9				3	97	17	7	0	14	13	14	7	10	4	0		県平均	0.0	少	(0.4)	
○ チャハマキ	やや多	並	南薩	289	6	7				6	94	31	0	6	6	6	0	0	6	12	0	1㎡当り	南薩	0.1	並	(0.2)	少：川辺1, さつま1, 有明(野井倉) 1, 錦江2
		並	北薩	148	10	6				10	90	30	20	0	0	0	0	0	0	10	0	虫数	北薩	0	並	(0.6)	
		やや多	大隅	728	38	18				38	63	13	0	25	0	38	50	13	25	13	0		大隅	0.6	多	(0.2)	
		やや多	県計	1,165	14	9				14	86	26	4	10	4	13	12	3	9	12	0		県平均	0.24	並	(0.3)	
○ チャノホソガ	並	やや少	南薩	289	6	21				6	94	31	6	6	25	25	18	41	12	29	13	1㎡当り	南薩	0.1	やや少	(2.8)	少：枕崎1, 溝辺2, 牧園1, 湧水1, 鹿 屋1, 錦江2
		並	北薩	592	40	36				40	60	40	40	30	20	50	30	50	40	40	20	巻葉数	北薩	4.5	多	(1.7)	
		やや多	大隅	728	38	25				38	63	50	0	38	0	38	25	50	25	25	0		大隅	1.3	多	(0.5)	
		並	県計	1,609	20	24				20	80	38	11	18	18	33	22	45	20	30	11		県平均	1.6	並	(1.9)	

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年（令和7年）8/12～25日調査

病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)								発病・発生数 (%, 頭, 枚)				備 考			
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24				本年	評価	平年
○ チャノミドリ ヒメヨコバイ	多	並	南薩	2,311	50	42			13	38	50	44	13	6	63	50	24	35	59	65	63	4ヶ所叩き 落とし虫数	南薩	2.4	やや多	(1.5)	中：知覧(菊永)1, 加世田1, さつま1, 出水1, 錦江1 少：顕娃(谷場)1・知覧(後岳)1, 川辺1, 枕崎2, 伊集院1, 出水1, 溝辺2, 牧園1, 湧水1, 末吉2, 有明(野井倉)2, 有明(原田)2, 鹿屋2, 錦江1
		多	北薩	1,332	90	47			20	70	10	40	30	30	90	60	40	30	50	50	50		北薩	5.6	やや多	(2.9)	
		多	大隅	1,941	100	43			13	88		25	13	63	50	50	38	25	63	25	75		大隅	4.1	多	(1.4)	
		多	県計	5,584	69	43			14	56	31	38	16	25	64	52	30	32	58	52	63		県平均	3.8	多	(1.9)	
○ チャノキイロ アザミウマ	やや多	やや多	南薩	4,043	88	75				88	13	88	50	81	94	81	59	47	82	82	88	4ヶ所叩き 落とし虫数	南薩	7.2	並	(8.8)	中：溝辺1 少：顕娃(谷場)2・顕娃(青戸)1, 知覧(菊永)2, 知覧(後岳)1, 川辺2, 加世田2, 枕崎2, 伊集院2, さつま1, 出水2, 溝辺1, 牧園1, 湧水1, 有明(野井倉)2, 有明(原田)2, 鹿屋2, 錦江2
		やや少	北薩	1,036	70	78			10	60	30	80	100	90	70	80	90	60	90	60	60		北薩	12.3	多	(7.3)	
		やや多	大隅	1,941	100	79				100		100	38	75	75	88	88	50	88	88	100		大隅	9.1	多	(5.4)	
		やや多	県計	7,020	87	77			2	85	13	89	56	81	85	83	71	50	85	80	85		県平均	9.1	やや多	(7.6)	
○ カンザワハダニ	やや多	やや多	南薩	2,311	50	37			6	44	50	50	38	38	44	50	41	6	65	24	19	寄生葉率	南薩	2.1	並	(2.2)	中：知覧(後岳)1, 有明(原田)1 少：顕娃(谷場)1・顕娃(青戸)1, 知覧(後岳)1, 川辺2, , 伊集院2, さつま1, 溝辺2, 牧園1, 湧水1, 末吉2, 有明(野井倉)1, 有明(原田)1, 鹿屋1
		多	北薩	1,036	70	51				70	30	50	40	60	40	50	50	40	60	50	70		北薩	5.2	やや多	(3.2)	
		並	大隅	971	50	43			13	38	50	25	63	25	50	63	38	38	63	13	50		大隅	4.1	並	(4.7)	
		やや多	県計	4,317	54	41			7	47	46	44	44	39	45	53	42	20	63	26	36		県平均	3.5	並	(3.1)	
クワシロ カイガラムシ	やや少	やや少	南薩	144	3	9		3			97	19	0	4	15	15	14	8	10	2	3	寄生株率	南薩	1.9	やや少	(15.1)	○発生程度 多：知覧(後岳)1 中：錦江3 少：錦江1 ○雄繭発生量 少6/10株：知覧(後岳), 少5/10株, 少3/10株, 少3/10株, 少2/10株： 錦江
		少	北薩	0	0	30					100	37	30	0	33	33	40	27	40	30	30		北薩	0.0	少	(20.7)	
		並	大隅	485	25	20			19	6	75	8	8	0	17	21	25	25	29	25	44		大隅	8.1	並	(11.9)	
		やや少	県計	630	8	15		2	5	2	92	19	8	2	18	20	21	15	20	13	18		県平均	2.8	少	(16.0)	
ヨモギ エダシヤク	多	やや多	南薩	289	6	3				6	94	13	6	0	13	0	0	0	0	0	0	※発生の 有無のみ	南薩		-	-	有：顕娃(谷場)1, 末吉2, 錦江1
		やや多	北薩	296	20	10				20	80	0	0	17	0	0	10	10	20	30	10		北薩		-	-	
		並	大隅	243	13	8				13	88	0	13	17	25	13	0	0	13	0	0		大隅		-	-	
		多	県計	827	10	5				10	90	7	7	7	13	3	2	2	7	5	2		県平均		-	-	
マダラカサハラハムシ	少	やや少	南薩	0	0	7					100					6	0	0	12	18	6	1㎡当り 被害芽数	南薩	0.0	-	-	
		少	北薩	0	0	25					100					30	30	20	20	30	20		北薩	0.0	-	-	
		少	大隅	0	0	8					100					13	13	0	13	13	0		大隅	0.0	-	-	
		少	県計	0	0	11					100					12	8	4	13	19	7		県平均	0.0	-	-	
チャトゲコナジラミ	-	-	南薩	0	0	-					100	-	-	-	-	-	-	-	-	29	19	寄生葉率	南薩	0.0	-	-	中：牧園1, 末吉2 少：溝辺1, 湧水1, 錦江2
		-	北薩	740	50	-			30	20	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	40		北薩	6.2	-	-	
		-	大隅	485	25	-				25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	38	25		大隅	1.8	-	-	
		-	県計	1,225	15	-			6	10	85	-	-	-	-	-	-	-	-	35	24		県平均	2.2	-	-	

※その他特記事項

南薩：薩摩中南西部 4, 576ha 8地点16ほ場 【南九州市顕娃町牧之内(谷場)②・顕娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘地)②】

北薩：川内川中流域・霧島山麓 1, 477h 6地点 10ほ場 【南さつま市加世田内山田(東山)②, 枕崎市別府(中原)②, 日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】

大隅：大隅中南部 1, 920ha 4地点 8ほ場 【さつま町船木(舟木)②, 出水市平和町②, 霧島市溝辺町麓(論地)②, 霧島市牧園町三休堂①, 湧水町木場①, 曾於市末吉町岩崎②】

県計(熊本・大島除く) 7, 973ha (R5) 18地点34ほ場 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②, 鹿屋市東原町②, 錦江町城元②】

※表中の「総合概評」は, 「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。