

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（8月下旬）

(No. 1) 調査年月日：2025年 8月12 ～ 20日

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（8月下旬） (No. 1) 調査年月日：2025年 8月12 ～ 20日																					生育 ステージ	節伸～出穂期（一部）	
病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)		程度別発生面積率（%）					年次別発生面積率（%）										記 事	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
〇いもち病	やや少	やや少	南 薩	625	50	27				50	50	50	20	60	10	20	0	30	50	10	20	少：永里1, 古殿2, 勝目2, 高尾野1, 平川1, 時吉2, 中津川2, 祁答院2	
			北薩平坦	293	5	23				5	95	29	33	33	4	33	8	42	38	9	0		
			北薩山間	1,387	35	38				35	65	64	36	36	32	14	41	55	68	10	20		
			大 隅	0	0	45					100	50	50	83	50	33	17	83	0	50	33		
			県 計	2,305	17	32				17	83	44	36	46	21	27	19	52	41	17	13		
〇紋枯病	並	並	南 薩	250	20	14				20	80	0	10	40	10	0	20	0	20	20	20	少：古殿1, 勝目1, 隼人1, 宮崎2, 鹿屋1	
			北薩平坦	878	15	15				15	85	8	13	25	8	29	8	4	25	14	20		
			北薩山間	0	0	7					100	9	23	9	5	5	5	0	9	5	5		
			大 隅	356	17	13				17	83	0	17	17	17	17	0	17	33	0	17		
			県 計	1,483	11	13				11	89	6	16	20	9	18	7	5	21	9	15		
縞葉枯病	並	並	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			北薩平坦	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			北薩山間	0	0	0					100	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0		
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			県 計	0	0	0					100	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
馬鹿苗病	やや多	多	南 薩	0	0	1					100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	少：宮崎2	
			北薩平坦	585	10	3				10	90	4	0	0	8	8	0	8	4	0	0		
			北薩山間	0	0	2					100	9	0	9	0	0	0	0	0	0	5		
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			県 計	585	4	2				4	96	5	0	3	4	4	0	4	2	0	1		
心枯線虫病	やや多	多	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	少：鹿屋1	
			北薩平坦	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			北薩山間	0	0	1					100	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5		
			大 隅	356	17	0				17	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			県 計	356	3	0.4				3	97	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1		
ごま葉枯病	やや多	やや多	南 薩	625	50	37				50	50	0	60	60	40	30	60	0	20	30	70	少：古殿2, 勝目2, 伊集院1, 蒲生1, 始良1, 隼人1, 入来1, 阿久根1, 高尾野1, 平川1, 大角1, 前目1, 田中1, 木崎2, 鹿屋1, 末吉2, 大隅1	
			北薩平坦	2,049	35	40				35	65	25	29	58	38	58	38	13	54	59	25		
			北薩山間	1,189	30	27				30	70	9	18	45	50	50	9	0	45	30	15		
			大 隅	1,422	67	38				67	33	17	67	50	33	0	100	17	50	33	17		
			県 計	5,285	40	35				40	60	17	36	53	40	42	42	8	48	43	24		

栽培面積：南薩 1,250 ha 北薩平坦 5,853 ha 北薩山間 3,964 ha 大隅 2,133 ha 平年は2015～2024の平均値。

注1) 「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

南 薩：南九州市知覧町 永里(2)・川辺町 古殿(2)・川辺町 勝目(2)，日置市伊集院町 大田(2)，いちき串木野市 大里(2)・・・調査ほ場数：10

北薩平坦：蒲生町 楠田(2)，始良市 三拾町(2)，隼人町 住吉(2)，霧島市国分 上小川(2)，薩摩川内市 宮崎(2)・高江(2)・入来浦之名(2)
阿久根市 鶴川内(2)，高尾野町 東干拓(2)・六月田(2)・・・調査ほ場数：20

北薩山間：さつま町 宮之城平川(2)・時吉(2)・鶴田町大角(2)・中津川(2)，薩摩川内市 祁答院町上手(2)

伊佐市菱刈 前目(2)・田中(2)，伊佐市大口木崎(2)・山野(2)，湧水町 北方(2)・・・調査ほ場数：20

大 隅：曾於市末吉町(2)・大隅町 笠木(2)，鹿屋市野里(2)・・・調査ほ場数：6

県 計 巡回調査地点数：28地点，調査ほ場数：56

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（8月下旬）

(No. 1) 調査年月日：2025年 8月12 ～ 20日

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（8月下旬） (No. 1) 調査年月日：2025年 8月12 ～ 20日																							生 育 ステージ	節伸～出穂期（一部）	
病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)		程度別発生面積率 (%)					年次別発生面積率 (%)										記 事			
					本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
ヒメトビウナ	並	並	南 薩	500	40	34				40	60	20	50	40	100	30	10	10	10	30	40	少:永里1, 古殿1, 勝目1, 市来1, 蒲生1, 始良2, 隼人1, 高江1, 入来2, 阿久根1, 高尾野1, 出水1, 湧水1, 平川1, 大角2, 中津川2, 前目2, 田中2, 木崎1, 山野2, 鹿屋1, 末吉2			
			北薩平坦	2,927	50	30				50	50	38	0	58	58	29	29	4	17	36	35				
			北薩山間	1,784	45	30				45	55	14	9	64	50	41	18	14	27	15	45				
			大 隅	1,067	50	42				50	50	33	67	67	83	50	0	17	17	17	67				
			県 計	6,277	48	33				48	52	28	19	60	65	36	19	10	19	26	44				
ツマクノコハヤ	やや多	多	南 薩	750	60	39				60	40	50	20	40	40	40	20	40	20	60	60	少:永里2, 古殿2, 市来1, 伊集院1, 蒲生2, 始良1, 隼人2, 高江2, 入来2, 阿久根1, 高尾野1, 出水2, 湧水1, 平川1, 大角2, 中津川2, 前目2, 田中2, 山野2, 鹿屋2, 末吉2, 大隅1			
			北薩平坦	3,804	65	35				65	35	46	25	38	50	29	25	13	21	32	75				
			北薩山間	2,577	65	41				65	35	36	36	68	45	18	36	0	45	45	75				
			大 隅	1,778	83	67				83	17	100	67	100	100	83	67	0	50	33	67				
			県 計	8,909	67	43				67	33	53	35	58	57	38	35	9	33	38	72				
オビイロウナ	並	並	南 薩	250	20	33				20	80	80	70	80	10	20	50	0	10	0	10	少:知覧1, 伊集院1, 隼人2, 入来1, 出水2, 山野1, 末吉2, 大隅1（入来のみ成虫）			
			北薩平坦	1,463	25	29				25	75	42	58	54	0	58	38	0	17	23	5				
			北薩山間	198	5	32				5	95	36	64	77	0	45	50	5	14	25	0				
			大 隅	1,067	50	40				50	50	33	100	100	0	100	33	0	17	0	17				
			県 計	2,978	23	32				23	77	42	68	72	1	59	42	1	15	17	6				
コブノメイ	並	並	南 薩	500	40	47			10	30	60	40	50	40	10	60	40	0	80	60	90	中:勝目1, 少:古殿2, 勝目1, 宮崎2, 入来2, 阿久根2, 平川1, 大角1, 中津川1, 祁答院2, 田中1, 木崎1, 山野2, 鹿屋2, 末吉2			
			北薩平坦	1,756	30	43				30	70	33	21	17	13	50	83	0	79	55	80				
			北薩山間	1,784	45	30				45	55	14	36	5	0	41	82	0	55	25	40				
			大 隅	1,422	67	55				67	33	50	67	33	17	83	100	0	67	33	100				
			県 計	5,462	41	42			1	40	59	31	36	19	10	55	82	0	70	43	72				
イカリメシ	並	並	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			北薩平坦	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0				
			北薩山間	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			大 隅	0	0	10					100	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0				
			県 計	0	0	2					100	0	0	0	0	10	0	0	2	9	0				
イモンシセリ	やや少	やや少	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			北薩平坦	0	0	1					100	0	0	4	0	0	0	0	0	5	0				
			北薩山間	0	0	1					100	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0				
			大 隅	0	0	7					100	0	0	0	17	50	0	0	0	0	0				
			県 計	0	0	2					100	1	0	3	3	10	1	0	0	2	0				
マカノコハヤ	多	多	南 薩	250	20	1				20	80	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	少:市来2, 入来1, 阿久根1, 平川1, 時吉1, 大角2, 中津川1, 祁答院1, 山野2			
			北薩平坦	585	10	2				10	90	8	0	0	0	0	0	0	0	0	10				
			北薩山間	1,586	40	5				40	60	5	14	5	0	0	0	0	0	0	25				
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			県 計	2,421	18	2				18	82	5	4	2	0	0	0	0	0	0	12				

栽培面積：南薩 1,250 ha 北薩平坦 5,853 ha 北薩山間 3,964 ha 大隅 2,133 ha 平年は2015～2024の平均値。

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

南 薩：南九州市知覧町 永里(2)・川辺町 古殿(2)・川辺町 勝目(2)，日置市伊集院町 大田(2)，いちき串木野市 大里(2)・・・調査ほ場数：10

北薩平坦：蒲生町 楠田(2)，始良市 三拾町(2)，隼人町 住吉(2)，霧島市国分 上小川(2)，薩摩川内市 宮崎(2)・高江(2)・入来浦之名(2)

阿久根市 鶴川内(2)，高尾野町 東干拓(2)・六月田(2)・・・調査ほ場数：20

北薩山間：さつま町 宮之城平川(2)・時吉(2)・鶴田町大角(2)・中津川(2)，薩摩川内市 祁答院町上手(2)

伊佐市菱刈 前目(2)・田中(2)，伊佐市大口木崎(2)・山野(2)，湧水町 北方(2)・・・調査ほ場数：20

大 隅：曾於市末吉町(2)・大隅町 笠木(2)，鹿屋市野里(2)・・・調査ほ場数：6

県 計 巡回調査地点数：28地点，調査ほ場数：56