

早期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（7月）

調査年月日：2025年7月14～17日（カムシ類：7月1～9日）

																					生育 ステージ	糊熟期～黄熟期
病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率（%）		程度別発生面積率（%）					年次別発生面積率（%）										記 事
					本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
いもち病 (穂いもち)	並	並	南 薩	825	50	25				50	50	71	29	21	21	7	14	50	21	14	0	少： 頰娃1、大浦1、加世田1、日吉2
			大 隅	0	0	18					100	36	36	0	0	21	7	50	21	7	0	
			県 計	825	23	21				23	77	51	33	9	11	15	10	50	21	10	0	
紋枯病	並	並	南 薩	825	50	14			10	40	50	21	29	0	21	0	0	14	43	14	0	中：大浦1 少：大浦1、加世田1、日吉1、吹上1 高山2、吾平1、
			大 隅	485	25	58				25	75	71	93	93	71	21	29	71	36	57	36	
			県 計	1,310	36	39			5	32	64	51	66	52	47	12	16	46	39	38	19	
黄萎病	並	並	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	1					100	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	0	0	0					100	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ごま葉枯病	並	並	南 薩	660	40	12			10	30	60	21	29	21	14	0	0	21	0	14	0	中：大浦1 少：大浦1、加世田1、
			大 隅	0	0	22					100	0	21	0	7	0	21	21	21	79	50	
			県 計	660	18	18			5	14	82	9	24	9	11	0	12	21	12	50	27	
内穎褐変病	やや少	やや少	南 薩	0	0	7					100	21	14	0	0	0	0	0	0	0	33	
			大 隅	0	0	6					100	14	14	0	0	0	0	7	7	0	14	
			県 計	0	0	6					100	17	14	0	0	0	0	4	4	0	23	

栽培面積：薩摩 1,650 ha 大隅 1,940 ha 熊毛 670 ha 平年は2016～2025の平均値。

注1) 「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。
注2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

薩摩： 南九州市頰娃町御領（2）、南さつま市加世田益山（2）・大浦町干拓（2）・金峰町田布施（2）、日置市日吉町吉利（2）・吹上町上田尻（2）・・・調査ほ場数：12ほ場（金峰は上旬調査のみ）
大隅： 志布志市有明町野井倉（2）、大崎町横瀬（2）、鹿屋市串良町有里（2）・吾平町上名（2）、東串良町川東（2）、肝付町後田（2）・・・調査ほ場数：12ほ場
熊毛： 中種子町 熊野（2）、南種子町 平山（2）・・・調査ほ場数：4ほ場（7月中旬は収穫済み）
県 計 ・・・巡回調査地点数：14地点（うち病虫害防除員調査分:熊毛2地点）、調査ほ場数：28ほ場

早期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（7月）

調査年月日：2025年7月14～17日（カメシ類：7月1～9日）

早期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（7月）																							生育 ステージ	糊熟期～黄熟期
調査年月日：2025年7月14～17日（カメシ類：7月1～9日）																								
病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率（％）		程度別発生面積率（％）					年次別発生面積率（％）										記 事		
					本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
セシロウカ	少	少	南 薩	495	30	77				30	70	86	93	71	79	86	86	57	64	64	83	少：顕娃1、大浦1、加世田1、串良2、高山2		
			大 隅	647	33	63				33	67	36	43	57	57	93	79	50	86	50	79			
			県 計	1,142	32	69				32	68	57	64	63	68	90	82	53	76	56	81			
ヒビロウカ	並	並	南 薩	495	30	18				30	70	0	50	7	36	43	0	0	36	0	8	少：加世田1、金峰1、吹上1		
			大 隅	0	0	14					100	0	36	0	21	29	7	14	29	7	0			
			県 計	495	14	16				14	86	0	42	3	28	35	4	8	32	4	4			
ヒメトビウカ	やや多	やや多	南 薩	1,320	80	45				80	20	36	86	57	21	36	29	14	71	21	83	少：顕娃2、大浦2、加世田2、日吉1、吹上1、串良1、高山2、吾平2		
			大 隅	808	42	41				42	58	21	50	79	43	36	57	21	29	14	64			
			県 計	2,128	59	43				59	41	27	65	69	32	36	45	18	48	17	73			
ツマゲロヨコバイ	並	やや多	南 薩	825	50	37				50	50	21	36	36	57	29	29	57	36	29	42	少：顕娃1、加世田2、日吉1、吹上1、高山1、吾平1		
			大 隅	323	17	22				17	83	29	29	43	21	21	7	7	29	14	21			
			県 計	1,148	32	29				32	68	26	32	40	39	25	17	29	32	21	31			
コブノメカ	多	やや多	南 薩	1,155	70	32		10	10	50	30	57	21	0	64	93	14	7	21	14	25	多：大浦1 中：吹上1 少：顕娃1、大浦1、日吉2、吹上1、串良2、高山2、吾平1		
			大 隅	808	42	23				42	58	14	14	0	79	79	7	0	7	7	21			
			県 計	1,963	55	27		5	5	45	45	32	17	0	72	85	10	3	13	10	23			
イネコメシ	やや少	やや少	南 薩	165	10	12				10	90	7	29	14	7	0	21	0	21	21	0	少：大浦1		
			大 隅	0	0	6					100	7	7	0	0	7	0	0	14	14	7			
			県 計	165	5	9				5	95	7	16	6	4	4	9	0	17	17	4			
カメシ類	多	やや多	南 薩	825	50	38		4	17	29	50	32	46	21	57	21	14	50	50	32	50	調査年月日：7月1～9日（傾穂期） 26ほ場／48ほ場＝54.2％		
			大 隅	1,132	58	56		4	13	42	42	29	32	71	89	71	39	39	57	41	86			
			県 計	1,957	55	47		4	14	36	45	30	38	50	73	50	28	44	54	37	69			

栽培面積：薩摩 1,650 ha 大隅 1,940 ha 熊毛 670 ha 平年は2016～2025の平均値。

注1）「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2）「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

薩摩： 南九州市顕娃町御領（2）、南さつま市加世田益山（2）・大浦町干拓（2）・金峰町田布施（2）、日置市日吉町吉利（2）・吹上町上田尻（2）・・・調査ほ場数：12ほ場（金峰は上旬調査のみ）
大隅： 志布志市有明町野井倉（2）、大崎町横瀬（2）、鹿屋市串良町有里（2）・吾平町上名（2）、東串良町川東（2）、肝付町後田（2）・・・調査ほ場数：12ほ場
熊毛： 中種子町 熊野（2）、南種子町 平山（2）・・・調査ほ場数：4ほ場（7月中旬は収穫済み）
県 計 ・・・巡回調査地点数：14地点（うち病虫害防除員調査分：熊毛2地点）、調査ほ場数：28ほ場