

大島地域		サトウキビ病害虫発生予察巡回調査月報（7月）																				令和8年7月8～17日調査									
作物名	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積(ha)	発生ほ場率(%)			発生程度(%)					年次別 発生ほ場率(%)										発病・発生数(%, 頭, 枚)					備 考		
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	’16	’17	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24	’25			本年	前年	評価		平年	
サトウキビ	黒穂病	多	多	奄美	590	8	8	1.6				8	93	0	0	0	0	2	0	0	4	2	8	100株当り発病株率	奄美	0.05	0.08	やや多	(0.02)	喜界島：少1 徳之島：少1	
		並	並	熊毛	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100株当り発病株率	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)		
サトウキビ	葉焼病	やや少	やや少	奄美	786	10	22	20				10	90	22	16	16	10	19	8	14	38	34	22	5茎当り病斑面積	奄美	0.1	1.1	やや少	(0.7)	奄美大島：少4	
		並	並	熊毛	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5茎当り病斑面積	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)		
サトウキビ	バッタ類	多	やや多	奄美	3,537	45	44	29			3	43	55	22	22	52	28	11	16	14	40	44	44	20株当り食害面積	奄美	2.9	1.6	多	(1.0)	奄美大島：少2 徳之島：中1, 少7 沖永良部島：少5 与論島：少3	
		並	並	熊毛	0	0	0	2					100	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20株当り食害面積	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)		
※その他特記事項																															
●調査地点																															
奄美地域40ほ場調査【奄美大島5, 喜界島5, 徳之島15, 沖永良部10, 与論島5】 熊毛地域5ほ場調査【種子島5】																															
但し、メイチュウ類については奄美地域80ほ場調査【奄美大島10、喜界島10、徳之島30、沖永良部島20、与論島10】 熊毛地域10ほ場調査【種子島10】																															
ツマジロクサヨトウについては奄美地域45ほ場調査【奄美大島5, 喜界島10, 徳之島15, 沖永良部島10, 与論島5】 熊毛地域5ほ場調査【種子島5】																															
※ 栽培面積：奄美地域7,860ha（夏植え:781ha、春植え:1,043ha、株出し:5,403ha、新植夏植え:633ha） 熊毛地域2,492ha（夏植え:172ha、春植え:403ha、株出し:1,765ha、新植夏植え:153ha）																															
（「令和6年産さとうきび及びびんしゃ糖生産実績」（令和7年9月 県農産園芸課）から出典）																															

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。