

作物名	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)			発生程度 (%)					年次別発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)					備 考	
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	前年	評価		平年
カンキツ	そうか病（春葉）	並	並	奄美	0	0	0	3					100	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	100葉当り 発病葉率	奄美	0.0	0.0	並	(0.02)	
カンキツ	そうか病（果実）	やや少	やや少	奄美	0	0	0	7					100	0	29	0	14	0	14	0	0	14	0	100果当り 発病果率	奄美	0.0	0.0	やや少	(0.1)	
カンキツ	かいよう病（春葉）	並	並	奄美	0	0	0	1					100	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	100葉当り 発病葉率	奄美	0.0	0.0	並	(0.01)	
カンキツ	かいよう病（果実）	やや多	多	奄美	127	29	0	4				29	71	14	0	0	0	0	14	0	14	0	0	100果当り 発病果率	奄美	0.3	0.0	多	(0.1)	奄美市住用：少1 瀬戸内町：少1
カンキツ	黒点病	並	並	奄美	0	0	0	1					100	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	100葉当り 発病葉率	奄美	0.0	0.0	並	(0.01)	
カンキツ	ミカンハダニ	やや少	やや少	奄美	0	0	29	6					100	0	14	14	0	0	0	0	0	0	29	100葉当り 寄生葉率	奄美	0.0	1.7	並	(0.2)	
カンキツ	サビダニ類	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100果当り 被害果率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	カイガラムシ類	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100果当り 寄生果率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	チャノキイロ アザミウマ	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100果当り 被害果率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	アブラムシ類	やや多	やや多	奄美	127	29	43	11				29	71	0	0	0	0	0	29	14	14	14	43	100新梢当り 寄生新梢率	奄美	0.4	1.9	並	(0.4)	奄美市住用：少2
カンキツ	ゴマダラカミキリ	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10樹当り 脱出孔率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	赤衣病	－	－	奄美	63	14	14	－				14	86									29	14	10樹当り 発病有無	奄美					瀬戸内町1

※その他特記事項

●調査地点

7 ほ場調査【名瀬3、住用2、瀬戸内2】調査品目は全てタンカン

※ 栽培面積 443ha（中晩柑類:411ha、その他32ha）（「果樹生産統計資料（令和5年産実績）」（令和7年3月 県農産園芸課）から出典）

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。