

病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)				備 考	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	評価		平年
○炭疽病	やや多	並	南薩	2,568	56	58				56	44	56	38	50	56	59	71	41	82	56	69	1㎡当り	南薩	5.4	並	(7.3)	中：牧園1, 少：谷場2, 青戸1, 菊永1, 枕崎2, 東山1, 川辺1, 伊集院1, さつま1, 出水1, 溝辺2, 牧園1, 末吉1, 原田2, 鹿屋1
		並	北薩	1,030	70	70			10	60	30	80	80	60	60	70	80	70	60	90	50	病葉数	北薩	11.1	並	(9.2)	
		並	大隅	717	38	35				38	63	25	38	50	13	25	25	38	50	38	50		大隅	2.4	並	(3.1)	
		並	県計	4,315	54	54			2	52	46	53	45	52	46	52	61	46	70	58	61		県平均	6.4	並	(6.9)	
○輪斑病	少	やや少	南薩	285	6	11				6	94	13	0	0	0	24	18	6	18	13	25	1㎡当り	南薩	0.1	やや少	(0.3)	少：伊集院1, 出水1, 牧園2
		やや少	北薩	442	30	43				30	70	40	40	30	60	40	50	60	60	20	30	病葉数	北薩	4.7	やや多	(3.5)	
		やや少	大隅	0	0	15				100	13	38	0	13	0	13	25	25	25	0	0		大隅	0.0	やや少	(0.8)	
		少	県計	727	9	18				9	91	17	17	5	14	20	22	20	27	17	20		県平均	1.4	並	(1.3)	
もち病	少	並	南薩	0	0	1					100	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.0)	
		少	北薩	0	0	11					100	20	20	0	10	20	10	10	10	10	0	病葉数	北薩	0.0	やや少	(0.5)	
		並	大隅	0	0	1					100	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.1)	
		少	県計	0	0	3					100	4	4	3	5	7	2	2	2	2	0		県平均	0.00	やや少	(0.2)	
○網もち病	やや少	並	南薩	0	0	2					100	6	0	0	0	0	12	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.07)	
		並	北薩	0	0	1					100	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	病葉数	北薩	0.0	並	(0.01)	
		並	大隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.00)	
		やや少	県計	0	0	1					100	4	0	0	0	2	7	0	0	0	0		県平均	0.0	並	(0.04)	
○チャノコカク モンハマキ	並	並	南薩	285	6	4				6	94	13	0	6	0	6	0	12	0	0	6	1㎡当り	南薩	0.1	並	(0.1)	少：伊集院1, 溝辺1
		並	北薩	147	10	15				10	90	20	10	10	20	10	10	10	0	30	30	虫数	北薩	0.2	並	(0.5)	
		並	大隅	0	0	3					100	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0		大隅	0.0	並	(0.1)	
		並	県計	433	5	6				5	95	11	5	5	4	5	2	9	0	9	9		県平均	0.1	並	(0.2)	
○チャハマキ	並	やや少	南薩	0	0	2					100	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.0)	少：牧園1
		並	北薩	147	10	6				10	90	20	0	0	10	0	20	0	0	0	10	虫数	北薩	0.4	並	(0.2)	
		やや少	大隅	0	0	8					100	13	0	13	0	38	0	0	13	0	0		大隅	0.0	やや少	(0.1)	
		並	県計	147	2	4				2	98	10	0	7	2	13	4	0	3	0	2		県平均	0.12	並	(0.1)	
○チャノホソガ	多	多	南薩	1,712	38	11				38	63	6	0	13	6	35	12	6	12	0	19	1㎡当り	南薩	0.7	並	(0.5)	中：鹿屋1 少：谷場1, 菊永1, 枕崎1, 東山1, 川辺1, 伊集院1, 溝辺1, 原田1, 錦江1
		少	北薩	147	10	41				10	90	40	50	30	40	50	40	30	50	20	60	巻葉数	北薩	0.1	やや少	(3.2)	
		多	大隅	717	38	13			13	25	63	0	38	0	0	0	13	0	38	13	25		大隅	6.6	多	(0.3)	
		多	県計	2,576	32	17			3	29	68	11	18	13	11	29	17	9	25	7	28		県平均	1.9	やや多	(1.2)	
○チャノミドリ ヒメヨコバイ	やや多	多	南薩	2,853	63	41				63	38	19	38	56	38	59	41	41	53	25	44	4ヶ所たつき	南薩	1.3	並	(1.1)	少：谷場2, 青戸1, 菊永1, 枕崎1, 東山2, 伊集院2, 川辺1, さつま1, 溝辺1, 牧園1, 末吉1, 原田1, 鹿屋1, 錦江2
		やや少	北薩	589	40	60				40	60	40	80	80	70	70	30	50	50	70	60	落とし虫数	北薩	1.6	少	(3.2)	
		やや多	大隅	956	50	38				50	50	13	50	63	38	13	38	25	63	38	38		大隅	2.4	やや多	(1.1)	
		やや多	県計	4,398	55	44				55	45	21	48	62	43	49	38	39	55	36	45		県平均	1.6	並	(1.7)	
○チャノキイロ アザミウマ	少	やや少	南薩	2,283	50	68				50	50	88	88	100	63	59	59	47	76	44	63	4ヶ所たつき	南薩	6.1	並	(10.3)	少：谷場1, 青戸2, 菊永1, 枕崎1, 川辺1, 伊集院2, さつま1, 出水2, 溝辺1, 牧園1, 鹿屋1,
		少	北薩	736	50	74				50	50	80	80	90	80	80	70	70	60	70	60	落とし虫数	北薩	1.0	少	(5.4)	
		少	大隅	717	38	80				38	63	100	75	75	88	50	63	75	75	100	100		大隅	4.1	やや少	(5.9)	
		少	県計	3,736	47	72				47	53	89	83	92	72	60	62	58	73	62	71		県平均	4.1	やや少	(7.9)	
○カンザワハダニ	多	多	南薩	1,427	31	15			6	25	69	13	6	13	0	24	24	6	24	6	31	寄生葉率	南薩	3.0	多	(0.5)	多：川辺1 少：青戸1, 菊永1, 後岳1, 川辺1, 末吉1, 原田1,
		少	北薩	147	10	29				10	90	30	40	10	50	50	20	30	10	30	20		北薩	1.0	並	(0.99)	
		並	大隅	239	13	11				13	88	0	13	13	0	0	0	50	13	0	25		大隅	1.0	多	(0.1)	
		やや多	県計	1,813	23	16			4	19	77	13	14	12	9	22	17	21	18	9	28		県平均	1.9	多	(0.6)	
		並	南薩	0	0	1					100	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	※発生の	南薩	-	-		

病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)				備 考	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	評価		平年
ヨモギ エダシヤク	並	並	北薩	0	0	2					100	0	0	0	0	0	0	20	0	0	有無のみ	北薩	-	-			
		並	大隅	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	-	-			
		並	県計	0	0	1				100	7	0	0	0	0	0	0	4	0	0		県平均	-	-			
マダラカサハラハムシ	やや多	やや多	南薩	571	13	5			6	6	88				6	24	6	0	0	0	0	1㎡当り 被害芽数	南薩	0.9	多	(0.1)	中：伊集院1, 野井倉1 少：谷場1, 溝辺1, 原田1
		やや少	北薩	147	10	19				10	90				20	20	10	10	30	30	10		北薩	0.1	やや少	(0.9)	
		多	大隅	478	25	7			13	13	75				0	25	0	13	0	13	0		大隅	1.3	やや多	(0.4)	
		やや多	県計	1,196	15	8			7	8	85				7	23	5	5	5	9	2		県平均	0.8	多	(0.4)	
チャトゲコナジラミ	並	少	南薩	285	6	26				6	94	-	-	-	-	-	-	41	25	13	寄生葉率	南薩	0.3	やや少	(0.5)	中：末吉2, 野井倉1 少：後岳1, さつま2, 出水1, 溝辺2, 牧園2, 錦江2	
		多	北薩	1,325	90	73			20	70	10	-	-	-	-	-	-	80	60	80		北薩	6.4	やや少	(10.4)		
		並	大隅	717	38	50			13	25	63	-	-	-	-	-	-	75	25	50		大隅	3.3	並	(3.9)		
		やや少	県計	2,327	29	41			7	23	71	-	-	-	-	-	-	56	31	34		県平均	2.8	やや少	(4.2)		

※その他特記事項

南薩：薩摩中南部 4,565ha	8地点16ほ場	【南九州市頤娃町牧之内(谷場)②・頤娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】 【南さつま市加世田内山田(東山)②、枕崎市別府(中原)②、日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】
北薩：川内川中流域・霧島山麓 1,472h	6地点 10ほ場	【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(論地)②、霧島市牧園町三体堂②、曾於市末吉町岩崎②】
大隅：大隅中南部 1,912ha	4地点 8ほ場	【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町城元②】
県計(熊毛・大島除く) 7,949ha (R6)	18地点34ほ場	

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」や「発生程度」を加味したものである。