

各関係機関の長 殿

鹿児島県病虫害防除所長

平成29年度技術情報第11号（チャのカンザワハダニ）について（送付）

このことについて、下記のとおり取りまとめましたので防除の参考にして下さい。

平成29年度技術情報第11号

1 対象病害虫 カンザワハダニ

2 対象作物 チャ

3 予報内容

(1) 発生地域 県本土

(2) 発生量 多

4 予報の根拠

(1) 9月の巡回調査における発生ほ場率は52%（平成25年25%）と平成より高かった。

また、寄生葉率も3.9%（平成25年1.9%）と平成より高い。

(2) 鹿児島地方气象台による向こう1か月の天候予報（平成29年9月28日発表）では、九州南部の気温は高いと予想されている。




図1 カンザワハダニの発生ほ場率と寄生葉率の推移

※病虫害防除所が実施した県内19地点（全34ほ場）における調査結果

5 防除対策及び防除上注意すべき事項

(1) 越冬前のハダニの密度は翌春の発生量に大きく影響するので、秋整枝後に防除を行う。発生が多い園では秋整枝直後と11月中旬～下旬に防除を行う。

(2) 薬剤は、葉裏まで十分にかかるように丁寧に散布する。

(3) 薬剤抵抗性を考慮し、同一系統の薬剤使用は年1回とする。