早期水稲栽培暦（令和7年12月作成）

南さつま農業協同組合
南薩地区農林技術協会
南薩地域米・麦・大豆等生産対策協議会

環境保全型農業に努め，肥料・農薬の適正使用と飛散防止に心がけましょう！

うまい米・売れる米を作りましょう！

区分＼月（旬）	3月 中	3月 下	4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下
稲の一生と管理作業	育苗準備 箱消毒	塩水選 種子消毒 浸種 催芽 播種	田植期			間断かん水		中干し	穂肥	周辺雑草除草・イネ科牧草収穫	出穂期	乳熟期		落水（収穫5日前）	成熟期 刈り取り 青籾率10～12%		すき込み・耕うん
	かん水																
	間断かん水																
主な対象病害虫名		◎種子消毒（苗立枯性病害） ○育苗箱消毒 ◎床土消毒	○苗立枯病 ○ウンカ類・いもち病・イネミズゾウムシ・ツマグロヨコバイ			○イネミズゾウムシ ○スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ） ○イネクロカメムシ	○いもち病		○イネカメムシ		◎紋枯病・穂いもち ◎カメムシ類	○カメムシ類					
◎基幹防除																	
○補完防除（発生の多い時に防除）																	
農薬名		タチガレエースM粉剤 モミガードC水和剤 スミチオン乳剤（イネシンガレセンチュウ） イチバン	稲名人箱粒剤 ダコレート水和剤			スクミノン なげこみトレボン スタークル豆つぶ	ゴウケツパック		スタークル液剤10		ノンブラストレバリダ粉剤DL	またはスタークル粉剤DL トレボン粉剤DL					
量（10アール）		箱6～8g	箱0.5ℓ	箱50g		1～4kg	10個		250g 4～6個		3～4kg	3～4kg		3kg			

適期刈り取り・過乾燥の防止
カメムシ多発時の補完防除
適期防除
土づくり
種子更新・健苗育成

次の点に注意しましょう

うまい米を作るために

適正な栽植密度を守りましょう！
（疎植気味の水田が多く見られます）
- 1㎡当たり20株以上は植えましょう
- 田植機の設定は，坪当たり70株以上，株間16cm以下で植えましょう

病害虫の発生情報は
病害虫防除所のテレホンサービス
099－296－6430
https://www.pref.kagoshima.jp/ag13/kiad/boujosho/index.html

除（抑）草剤 使用基準

薬剤名	使用時期	10a使用量	使用回数（回以内）	水田一年生雑草 イネ科	水田一年生雑草 非イネ科	マツバイ	ホタルイ	キシュウスズメノヒエ	ミズガヤツリ	クログワイ	コウキヤガラ	オモダカ	ウリカワ	ヒルムシロ	アオミドロ	藻類による表層はく離
クサトッタ1キロ粒剤	移植時 ※田植同時散布機で施用する場合 移植直後～ﾉﾋﾞｴ2葉期(但し,移植後30日まで)	1kg	1	○	○	○	○		○				○	○	○	○
サラブレッドKAIフロアブル	移植時 ※田植同時散布機で施用する場合 移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期(但し,移植後30日まで)	500ml	1	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
サラブレッドKAI1キロ粒剤	移植時 ※田植同時散布機で施用する場合 移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期(但し,移植後30日まで)	1kg	1	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
エンペラー豆つぶ250	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期(但し,収穫60日前まで)	250g	1	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
クラッシュEXジャンボ	移植後3～10日(ﾉﾋﾞｴ2葉期まで)	10個(500g)	1	○	○	○	○		○				○	○	○	○
エンペラージャンボ	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期(但し,移植後30日まで)	10個(250g)	1	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
バサグラン液剤	移植後15～収穫45日前まで	500～700ml 散布液量70～100ℓ	2		○	○	○		○	○	○	○	○			
クリンチャーEW	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ6葉期(但し,収穫30日前まで)	100ml 散布液量25～100ℓ	2	ﾉﾋﾞｴ ｱｵﾐﾄﾞﾛ				○								
モゲトン粒剤	発生始～発生盛期(但し,収穫45日前まで)	2～3kg	3												○	○
	ｳﾘｶﾜの増殖初期(2～4葉期)またはﾋﾙﾑｼﾛの発生始～増殖始(但し,収穫45日前まで)	3～4kg											○	○		
グラスショート液剤（抑草剤）	雑草生育初期（草丈10cm）及び草刈り後10～20日の雑草再生期（但し,収穫前日まで）	300～500ml 通常散布液量50～100ℓ 少量散布液量25ℓ	3	雑草の成長を抑制する剤です 水田畦畔の草刈り後に散布することで，その後の草刈り回数が減り，作業が楽になります												

※ ジャンボ剤と豆つぶ剤の使用にあたっては，水の出入りを止めて5～6cmの湛水状態にし，処理後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保ち，落水やかけ流しはやめましょう。

※ 農薬の登録状況は，令和7年12月現在です。

※ 農薬の使用にあたっては，容器包装に表示してある使用方法を確認して使用してください。

＜黄萎病・縞葉枯病の耕種的対策＞
収穫後早期に耕して，再生イネ（ひこばえ）の発生を抑えるとともに，休耕田や畦畔等の周辺を含む冬雑草も除草しましょう。

殺菌・殺虫剤 使用基準

薬剤名	使用時期等	使用回数（回以内）	苗立枯病	ばか苗病	イネシンガレセンチュウ	いもち病	紋枯病	スクミリンゴガイ	ツマグロヨコバイ	イネミズゾウムシ	コブノメイガ	カメムシ類
タチガレエースM粉剤	は種前,育苗箱土壌均一混和	1	○									
モミガードC水和剤	浸種前,200倍液,24時間種子浸漬	1	○	○		○						
スミチオン乳剤	は種前,1000倍液,6～72時間浸漬	1			○							
	収穫21日前まで,1000倍液	2			○							○
ダコレート水和剤	は種時,400倍,灌注	1				○						
	は種時～緑化期(但しは種14日後まで)	2	○									
稲名人箱粒剤	は種時（覆土前）～移植当日	1				○			○	○	○	
スクミノン	収穫60日前まで	2			.		○					
なげこみトレボン	5葉期以後,収穫21日前まで	3							○	○		注
ゴウケツパック	出穂5日前まで，但し収穫30日前まで	1				○						
ブラシン粉剤DL	収穫7日前まで	2				○						
ブラシンバリダ粉剤DL	収穫14日前まで	2				○	○					
ノンブラストレバリダ粉剤DL	収穫14日前まで	2				○	○		○		○	○
トレボン粉剤DL	収穫7日前まで	3							○	成虫	○	○
トレボン乳剤	収穫14日前まで	3							○	○	○	○
スタークル粉剤DL	収穫7日前まで	3							○			○
スタークル液剤10	収穫7日前まで	3							○			○
スタークル豆つぶ	収穫7日前まで	3							○			○
アミスターエイト	収穫14日前まで	3							○	○		

※ スミチオン乳剤は，メーカーによって水稲に登録のないものがあります。

※ ダコレート水和剤は，メーカーによって使用時期，使用回数が異なるものがあります。

※ なげこみトレボンのカメムシ類は，イネクロカメムシを対象となります。

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の発生ほ場では

① 冬場に**ロータリー**をかけ殺貝しましょう。これは寒い時期が効果的です。
② 卵の塊をできるだけ除去しましょう。
③ 田植後は**浅水管理**にしましょう。

土づくりと施肥設計（単位：10アール当たり）

収穫後，できるだけ早めに散布しましょう。

完熟堆肥
地力維持・向上のため堆肥を施しましょう。
①牛ふん堆肥の場合　1，000kg

土壌改良資材
①ケイテツ　100kg　秋落ち・倒伏防止
②ケイカル　100kg　病害虫抵抗性増大
③鉄入りｴﾝﾘｯﾁ40号　100kg　ｹｲ酸,鉄,ﾘﾝ酸等の補給
④アヅミン　20～40kg　腐植，保肥力向上
⑤シリカサポート1号　40～80kg　ｹｲ酸,鉄,ﾘﾝ酸等の補給
⑥農力アップ　60～100kg　ｹｲ酸,鉄,ﾘﾝ酸等の補給

コシヒカリ　干拓地域　例　　※肥料名の（ ）：窒素-リン酸-カリ-苦土の成分割合

	肥料名	基肥	追肥	穂肥	成分含有量 窒素	リン酸	カリ	苦土
①	苦土重焼燐(0-35-0-4.5)	20kg			7.0kg	12.4kg	7.6kg	0.9kg
	BB284(12-18-14-0)	30kg						
	BBNK77(17-0-17-0)		10kg	10kg				
②	苦土重焼燐(0-35-0-4.5)	20kg			6.0kg	14.0kg	8.0kg	1.4kg
	水稲一発くん・早期用(12-14-16-1)	50kg						

なつほのか の場合

①	苦土重焼燐(0-35-0-4.5)	20kg			9.6kg	13.0kg	6.0kg	2.1kg
	イクヒカリ専用肥料(16-10-10-2)	60kg						

コシヒカリ　干拓以外の地域　例

	肥料名	基肥	穂肥	成分含有量 窒素	リン酸	カリ	苦土
①	苦土重焼燐(0-35-0-4.5)	20kg		5.7kg	14.2kg	6.5kg	0.9kg
	BB284(12-18-14-0)	40kg					
	BBNK77(17-0-17-0))		5kg				
②	苦土重焼燐(0-35-0-4.5)	20kg		4.8kg	12.6kg	6.4kg	1.3kg
	水稲一発くん・早期用(12-14-16-1)	40kg					

※化学肥料を減らすために野菜栽培後は減肥しましょう。