

# 北薩感染症情報

2023年第45週(11月6日~11月12日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール [kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp](mailto:kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp)

## 川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報発令中    ○: 注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル			注意報レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始基準値	終息基準値	基準値		前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報	前週報告数(人)	今週報告数(人)	定点報告数	前週からの増減	警報注意報
		定点報告数													
内科・小児科定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	119	251	35.86	↗	◎	264	160	32.00	↓	◎	
	COVID-19	-	-	-	13	20	2.86	↗	-	6	4	0.80	↓	-	
小児科定点	RS	-	-	-	-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	-	3	8	2.00	↗	-	9	14	4.67	↗	◎	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	-	5	8	2.00	↗	-	10	4	1.33	↓	-	
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	-	21	8	2.00	↓	-	1	-	-	↓	-	
	水痘	2.0	1.0	1.0	-	2	0.50	↗	-	-	-	-	→	-	
	手足口病	5.0	2.0	-	16	13	3.25	↓	-	4	8	2.67	↗	-	
	伝染性紅斑	2.0	1.0	-	-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
	突発性発疹	-	-	-	-	1	0.25	↗	-	-	1	0.33	↗	-	
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	-	-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	-	-	-	-	→	-	/	/	/	/	/	
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	-	1	2	2.00	↗	-	/	/	/	/	/	
基幹定点	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
	クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	-	-	-	-	-	-	→	-	-	-	-	→	-	
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告	-	-	-	-	2	-	↗	-	3	3	/	→	-		
指定医療機関からの COVID-19入院報告	-	-	-	-	-	-	→	-	-	-	/	→	-		
報告数合計		-	-	-	178	315	/	↗	/	297	194	/	↓	/	

<注意報・警報レベル>  
 ・川薩保健所管内 インフルエンザ(警報レベル), 手足口病(警報レベル)  
 ・出水保健所管内 インフルエンザ(警報レベル), 咽頭結膜熱(警報レベル)

<全数報告>  
 ・川薩保健所管内 結核1例  
 ・出水保健所管内 結核1例

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>  
 ・川薩保健所管内 学級閉鎖: 薩摩川内市1件  
 ・出水保健所管内 学級閉鎖: 長島町1件

定点種別	疾病	警報/終息基準値	注意報基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				36W	37W	38W	39W	40W	41W	42W	43W	44W	45W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	0.57	1.29	4.14	6.43	3.86	3.86	18.00	16.86	17.00	35.86
	COVID-19	—	—	15.86	17.57	9.86	11.43	6.86	4.29	3.14	1.14	1.86	2.86
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	—	—	—	0.75	—	—	0.25	—	—
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.25	—	—	0.25	—	—	0.25	0.25	0.75	2.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	1.75	1.00	0.25	0.25	0.75	0.50	0.50	1.00	1.25	2.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	2.25	0.50	2.50	2.00	0.25	2.50	3.25	4.75	5.25	2.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.25	0.25	—	—	—	—	0.25	—	—	0.50
	手足口病	5.00/2.00	—	1.00	2.25	3.00	2.50	2.00	3.50	5.25	3.00	4.00	3.25
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	突発性発疹	—	—	0.75	1.25	0.50	0.50	0.25	0.25	—	0.75	—	0.25
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	0.75	1.00	—	—	0.25	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	—	
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	3.00	3.00	—	2.00	1.00	—	1.00	—	1.00	2.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 <small>病原体がロタウイルスに限る</small>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息基準値	注意報基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				36W	37W	38W	39W	40W	41W	42W	43W	44W	45W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	2.00	2.20	1.40	3.80	2.00	7.00	42.00	58.60	52.80	32.00
	COVID-19	—	—	20.40	16.60	7.40	12.60	6.80	3.80	1.80	0.80	1.20	0.80
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	1.67	1.33	0.33	0.33	2.33	1.67	2.00	3.00	3.00	4.67
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	—	1.00	0.67	0.67	—	2.33	0.67	1.00	3.33	1.33
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	—	1.00	—	0.33	—	1.00	—	0.67	0.33	—
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	0.67	—	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	1.00	0.67	1.67	1.00	0.67	3.33	2.67	3.33	1.33	2.67
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	突発性発疹	—	—	1.00	0.33	—	—	—	0.33	—	—	—	0.33
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	3.00	0.67	0.67	1.00	1.33	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 <small>病原体がロタウイルスに限る</small>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

★第 45 週に関しては川薩においてもインフルエンザの警報が発令されました。出水においては咽頭結膜熱の警報も発令されました。どちらの地域でも引き続き感染症に注意してください。学級閉鎖は薩摩川内市で 1 件，長島町で 1 件でした。急に寒くなりましたので身体を冷やさないよう，上着を着用したり湯船につかったりして体温調節をしましょう。

★新型コロナウイルスに関する参考資料  
 新型コロナウイルス感染症 「診療の手引き」  
<https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf>

新型コロナウイルス感染症 「病原体検査の指針」  
<https://www.mhlw.go.jp/content/000914399.pdf>

新型コロナウイルス感染症 「罹患後症状のマネジメント」  
<https://www.mhlw.go.jp/content/000952747.pdf>

# インフルエンザの警報が 出ています!!!



## インフルエンザとは...?

インフルエンザウイルスに感染することによって起こる感染症です。まれに小児では急性脳症を、高齢の方や免疫が低下している方では肺炎を起こし、重症化します。

季節性インフルエンザはインフルエンザウイルスが毎年少しずつ変化することで流行するインフルエンザです。一方、新型インフルエンザとは、その変化が大きく、ほとんどの国民が免疫を獲得していないため、全国的に、急速に、まん延することにより起こります。新型インフルエンザはいつ、どこで発生するか予測することは困難ですので、日頃より、感染症対策をしましょう。

症状 ・38℃以上の発熱・頭痛・関節痛・筋肉痛・のどの痛み・鼻汁・咳  
・急性脳症(お子様)・肺炎(高齢の方, 免疫力の低い方)

## 感染の仕方は?



咳



くしゃみ



会話



握手



ドアノブやスイッチ

- ① **飛沫感染**... 飛沫とともに放出されたウイルスが、鼻やのどの粘膜に付着したり吸い込まれたりして感染する。
- ② **接触感染**... くしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に、触れた場所にウイルスが付着し、その付着したウイルスに触れた手で鼻や口に触れることにより感染する。



## インフルエンザ予防!



### ・飛沫感染対策としての「咳エチケット」

\*「咳エチケット」

- ① 普段から皆が咳やくしゃみを他の人に向けて発しないこと
- ② 咳やくしゃみが出るときはできるだけマスクをすること
- ③ 手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗うこと

### ・外出後の手洗い等

アルコール製剤による手指衛生も効果◎

### ・適度な湿度の保持

室内は加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保つ◎

### ・十分な休養とバランスのとれた栄養摂取

### ・人混みや繁華街への外出を控える



## インフルエンザにかかったら...

- ・具合が悪い場合は早めの受診を。
- ・安静にして、休養を。  
特に、睡眠を十分にとることが大切。
- ・十分な水分補給。  
お茶でもスープでも飲みたいものでOK。
- ・咳やくしゃみ等の症状のある場合は、感染拡大防止で不織布製マスクを着用
- ・人混みや繁華街への外出を控える。  
無理をして学校や職場等に行かない。



# 感染経路について学びましょう




## 感染経路とは...？

感染症とは病原体（ウイルスや細菌などの病気の原因となるもの）が体内に侵入し、症状が出る病気をさします。病原体の侵入の仕方のことを感染経路といい、“垂直感染”と“水平感染”に分けられます。

垂直感染は母子感染ともいわれ、妊娠中や出産時に病原体が体内に侵入してしまう感染のことです。

水平感染は感染源から周囲に広がるものでヒトからヒト、モノからヒトに感染します。この感染経路はさらに“空気感染（飛沫核感染）”“飛沫感染”“接触感染”などに分けられます。

感染経路によって感染症対策の方法が異なりますので、感染経路を把握しておくことが効果的な予防につながります。




## 感染症対策・予防法

- 垂直感染...母：予防接種，定期健診
- 空気感染...換気，個室管理，N95マスク着用
- 飛沫感染...咳エチケット
- 接触感染...石けんでの手洗い（特にトイレ後・食事前），アルコールによる手指消毒，物の共有を避ける，共有物のこまめな消毒（スイッチ，ドアノブ等）



※感染症ごとに効果的な対処法がありますので、厚生労働省ホームページや国立感染症研究所ホームページをご覧ください。

11月10日はHTLVデーです！



## HTLVデーとは...？

鹿児島県を含む西日本において、ATL(成人T細胞性白血病)やHAM(HTLV-1関連脊髄症)患者が多い傾向にあります。これらの起因となるものはHTLV-1というウイルスです。それらの予防と早期発見のために、県では日本HTLV-1学会が制定したHTLVデーにHTLV-1の正しい知識の普及啓発を行っています。

## 県での取り組み

- 鹿児島県HTLV-1感染防止マニュアル作成  
ATLについての正しい知識の啓発,  
キャリアの方への情報提供やカウンセリングに対応
- 鹿児島県ATL制圧10カ年計画報告書の作成  
取り組みや成果をまとめ、今後のATLの予防と治療に対応
- HTLV-1のリーフレット(Q&A方式)作成  
母子感染防止の普及啓発を図る
- HTLV-1抗体無料検査  
場所: 県内各保健所(要予約)  
対象: 高校生以上(妊婦を除く)



※キャリア...ウイルスに感染しているが、症状は出ていない方のこと

## HTLV-1とは...？

ヒトT細胞白血病ウイルス1型の略称です。白血球のうちのリンパ球(ヘルパーT細胞)に感染します。このウイルスは感染した細胞に自分のDNAを組み込んでしまうため、一度感染すると薬などでは排除することができず、生涯感染したままとなります。感染すると必ず発症する訳ではなく、約95%の方が無症状のままです。しかし、約5%の方はATLやHAMなどを発病します。喫煙や既往歴のある親族がいる場合、ATLを発病する確率が高いと言われています。

『Hot Lives HTLV-1情報 ポータルサイト』にも詳しく記載されておりますので、参考にしてください。

咽頭結膜熱の警報が出ています！

・接触感染  
・飛沫感染

### 咽頭結膜熱とは...？

アデノウイルスというウイルスによって、発熱やのどの痛み、結膜炎などを発症する病です。プールでの接触やタオルの共有が原因で移ることもあるため、“プール熱”とも言われます。6月～8月の小児に多く見られる病気ですが、今期に入り、全国的に患者報告数が増えています。高熱が比較的長く続き、5日ほど続きます。特別な治療法はありませんが、ほとんどの場合は自然治癒します。

吐き気、頭痛、激しい咳が続く場合は早めに医療機関に相談しましょう。



咽頭結膜熱に感染した場合、学校や幼稚園などは出席停止になります。  
主要な症状がなくなってから2日間経過後、出席可能となります。



### 感染の仕方は...？

- ・汚染されたプールの水に入る
- ・タオルを共有する
- ・汚染された手で粘膜に触れる
- ・咳やくしゃみを吸い込む

### 感染対策は...？

- ・プールに入った後はシャワーとうがいをする
- ・石けんで手を洗う
- ・タオルの共有をしない
- ・共有のものは消毒を行う
- ・咳エチケットを心がける



全国的に  
増えています！！