

北薩感染症情報

2025年第13週(3月24日～3月30日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165

FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎：警報発令中 ○：注意報発令中

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始 基準値	終 息 基準値	基準値	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点報告数												
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	7	23	3.29	↗	－	3	15	3.00	↗	－
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	－	－	－	11	7	1.00	↓	－	15	10	2.00	↓	－
小児科定点	RS	－	－	－	3	3	0.75	→	－	13	11	3.67	↓	－
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	－	－	4	1.00	↗	－	1	3	1.00	↗	－
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	－	8	8	2.00	→	－	9	15	5.00	↗	－
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	－	137	61	15.25	↓	◎	18	18	6.00	→	－
	水痘	2.0	1.0	1.0	1	1	0.25	→	－	4	－	－	↓	－
	手足口病	5.0	2.0	－	1	－	－	↓	－	－	－	－	→	－
	伝染性紅斑	2.0	1.0	－	－	－	－	→	－	2	6	2.00	↗	◎
	突発性発疹	－	－	－	－	1	0.25	↗	－	－	－	－	→	－
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	－	－	－	－	→	－	／	／	／	／	／
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	－	11	7	7.00	↓	◎	／	／	／	／	／
基幹定点	細菌性髄膜炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	無菌性髄膜炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	マイコプラズマ肺炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	クラミジア肺炎	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	－	－	－	－	－	－	→	－	－	－	－	→	－
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		－	－	－	－	－	／	→	－	－	－	／	→	－
指定医療機関からの COVID-19入院報告		－	－	－	－	－	／	→	－	－	－	／	→	－
報 告 数 合 計		－	－	－	179	115	／	↓	／	65	78	／	↗	／

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 感染性胃腸炎(警報レベル), 流行性角結膜炎(警報レベル)
- ・出水保健所管内 伝染性紅斑(警報レベル)

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W	13W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	14.86	7.00	3.29	3.43	1.86	2.00	2.57	1.86	1.00	3.29
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	7.86	5.43	6.86	2.71	3.29	2.57	2.71	0.86	1.57	1.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	0.25	—	—	—	—	0.75	1.00	0.75	0.75
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.25	0.25	0.75	0.50	0.75	0.75	2.25	0.25	—	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	0.75	0.50	1.00	0.75	1.25	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	6.50	10.00	11.00	6.75	17.75	16.50	25.50	31.00	34.25	15.25
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	0.25	—	—	0.25	—	0.50	0.25	0.25	0.25
	手足口病	5.00/2.00	—	—	0.50	—	—	—	—	0.25	0.25	0.25	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	0.25	—	—	—
	突発性発疹	—	—	0.25	0.25	0.25	0.25	—	—	—	—	—	0.25
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼科定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	7.00	2.00	1.00	5.00	4.00	7.00	10.00	11.00	11.00	7.00
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	感染性胃腸炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W	13W
内科・小児科 定点	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	31.80	4.40	0.80	—	0.40	2.80	5.00	5.60	0.60	3.00
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	4.80	1.20	3.00	5.00	1.80	3.20	2.00	2.40	3.00	2.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	—	—	0.33	—	0.33	1.00	1.33	4.33	3.67
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	1.33	0.67	1.67	1.00	2.33	—	1.00	0.33	0.33	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	5.33	5.67	9.00	4.67	5.00	4.00	2.33	5.67	3.00	5.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	3.00	2.00	7.67	6.00	4.67	7.67	7.00	5.33	6.00	6.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.33	0.33	0.67	—	—	—	1.00	0.33	1.33	—
	手足口病	5.00/2.00	—	—	—	—	—	—	0.33	—	—	—	—
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	0.33	—	0.33	1.00	1.00	2.67	3.33	2.33	0.67	2.00
	突発性発疹	—	—	—	—	—	0.67	0.33	0.33	0.33	—	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼科定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	7.00	2.00	1.00	5.00	4.00	7.00	10.00	11.00	11.00	7.00
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	感染性胃腸炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第13週において、川薩保健所管内では感染性胃腸炎と流行性角結膜炎が警報中であり、出水保健所管内では伝染性紅斑が警報レベルまで報告数が増加しています。インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等はありませんでした。

川薩保健所管内では、感染性胃腸炎の集団感染が相次いでいます。家庭内だけでなく、職場や学校において共有で使用しているものが多くあります。また、イベントや一斉に食事をする機会が多いため、感染者がでる前に、日頃からの感染対策を行いましょう。ノロウイルスはアルコール消毒の効果が期待できません。石鹸と流水で15秒以上手を洗い、清潔なタオルでしっかり水気を拭き取りましょう。症状は1～2日で自然治癒しますが、その後も1週間程度は便からウイルスが排出されます。二次感染を防ぐため、症状経過以後もしばらくは感染の恐れがあることを覚えておきましょう。



国内で麻疹患者発生の
報告がありました！

・空気感染
・飛沫感染
・接触感染

麻疹(はしか)とは...？

麻疹(はしか)とは、麻疹ウイルスによって引き起こされる、急性の全身性感染症です。

ウイルスはヒトからヒトへと感染が伝搬し、その感染力は非常に強いと言われています。空気感染するため、マスクでは予防できません。免疫を持っていない方が感染すると、ほぼ100%発症し、一度感染して発症すると、一生免疫が持続すると言われています。

原因病原体: 麻疹ウイルス

症状: 感冒症状(発熱, 咳, 鼻汁)→解熱, 口の中に白い斑点発生→高熱→発疹(耳後部, 頸部, 顔, 体幹, 上肢, 下肢の順に広がる)

潜伏期: 10~12日

特徴: 症状が一部のみ発症する麻疹(修飾麻疹)もみられる。
現在は海外からの輸入例および輸入例からの感染事例のみ。

下記, 航空機を利用された方は

令和7年3月31日までの健康観察が必要です。

3月10日: グレーターベイ航空

- ・ バンコク → 香港 HB298便 (3:05発→7:00着)
- ・ 香港 → 関西国際空港 HB340便 (8:25発→13:05着)



- 麻疹は空気感染するため, 当該航空機を利用された方全員が健康観察の対象です。
- 麻疹を疑われる場合は事前に医療機関へ麻疹かもしれないことを伝え, 指示に従ってください。
- 受診時はマスクを着用し, 公共交通機関の利用は避けましょう。



アルコール消毒効果あり!!!

※アルコール消毒のみでは予防不十分です。

(国立感染症研究所HP, 厚生労働省HP参考)



感染性胃腸炎(特にノロウイルス感染症)
にご注意ください！

・接触感染
・経口感染

ノロウイルスとは...？

ノロウイルスとは、ヒトに対して嘔吐や下痢など急性胃腸炎症状を引き起こすウイルスです。

汚染された二枚貝の生・加熱不十分な調理での喫食だけではなく、ヒトの手などを介することでも感染します。感染した方が汚染された手で共有のスイッチやリモコン、ドアノブに触れたり、食品を扱ったりするだけで多くの人にウイルスをばらまいてしまいます。

子どもやお年寄りの方はと物を喉に詰まらせてしまい、窒息してしまう恐れがあります。そういった方が集まる職場では特にウイルスを持ち込まないように気をつけましょう。

原因病原体：ノロウイルス

症状：吐き気、嘔吐、下痢、腹痛

潜伏期：1～2日

流行時期：秋口～春先

特徴：少量のウイルスの侵入であっても発症する。

症状が消失した後も3～7日ほど便中にウイルスが排泄される。



こんなことに注意しましょう。

☑トイレに携帯電話を持ち込まない

携帯電話に病原体が付着してしまいます

☑アルコール消毒だけではなく、石鹸による手洗いを行う

ノロウイルスにはアルコールの効果が高い傾向にあります。15秒以上手を洗いましょう。

☑と物や排泄物処理時は換気を行い、ガウン等で身を守る

病原体は空気中を漂い、吸い込んでしまいます。洋服や手への付着を防ぎましょう。

☑共有部分は次亜塩素酸ナトリウムを使用して消毒をする

アルコール消毒は効果が低いため、ほとんど意味がありません。

スプレーはウイルスが舞ってしまうのでNGです。



アルコール消毒の効果が
低い病原体もあります...
(ノロウイルスは効果が低い)

(国立感染症研究所HP、厚生労働省HP参考)