

北薩感染症情報

2026年第28週(7月6日～7月12日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報レベル

○: 注意報レベル

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開 始 基準値	終 息 基準値	基準値	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 あたり 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 あたり 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点あたり報告数												
急性呼吸器感 染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	196	211	70.33	↑	—	112	102	51.00	↓	—
	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	64	65	21.67	↑	—	19	30	15.00	↑	—
小児科定点	RS	—	—	—	4	6	3.00	↑	—	—	—	—	→	—
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	1	1	0.50	→	—	—	1	1.00	↑	—
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	—	1	0.50	↑	—	3	7	7.00	↑	—
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	6	5	2.50	↓	—	—	—	—	→	—
	水痘	2.0	1.0	1.0	—	—	—	→	—	1	—	—	↓	—
	手足口病	5.0	2.0	—	24	18	9.00	↓	⊙	25	11	11.00	↓	⊙
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	—	2	1.00	↑	—	1	—	—	↓	—
	突発性発疹	—	—	—	1	2	1.00	↑	—	—	—	—	→	—
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	—	2	1.00	↑	—	4	2	2.00	↓	—
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—	／	／	／	／	／
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	1	2	2.00	↑	—	／	／	／	／	／
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	—	—	／	→	—
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	—	—	／	→	—
報 告 数 合 計		—	—	—	297	315	／	↑	／	165	153	／	↓	／

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 手足口病(警報レベル)
- ・出水保健所管内 手足口病(警報レベル)

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

 警報レベル  注意報レベル

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				19W	20W	21W	22W	23W	24W	25W	26W	27W	28W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	46.33	63.33	69.00	51.00	79.33	69.33	62.33	57.33	65.33	70.33
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	0.67	2.00	4.33	6.67	13.00	21.67	15.67	17.33	21.33	21.67
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	1.00	1.00	3.00	1.50	1.00	2.50	0.50	2.00	3.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	—	—	0.50	0.50	1.50	0.50	—	2.50	0.50	0.50
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	—	2.00	4.50	1.00	—	0.50	2.00	2.50	—	0.50
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	0.50	6.50	4.50	5.00	4.50	1.00	5.00	6.50	3.00	2.50
	水痘	2.00/1.00	1.00	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	1.50	2.00	4.00	2.50	10.00	26.00	11.50	14.00	12.00	9.00
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	1.00	1.50	3.00	0.50	2.00	1.50	1.00	0.50	—	1.00
	突発性発疹	—	—	0.50	—	0.50	—	0.50	0.50	0.50	—	0.50	1.00
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	0.50	—	1.00	—	2.00	2.00	1.00	—	—	1.00
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	1.00	1.00	2.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				19W	20W	21W	22W	23W	24W	25W	26W	27W	28W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	26.50	39.50	37.50	27.00	35.50	28.50	38.50	32.50	56.00	51.00
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	1.00	0.50	—	—	2.50	5.00	2.00	9.50	15.00
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	6.00	1.00	1.00	2.00	—	1.00	—	1.00	—	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	2.00	7.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	7.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	—	3.00	—	—	—
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	1.00	—	1.00	—
	手足口病	5.00/2.00	—	—	1.00	9.00	7.00	8.00	20.00	19.00	17.00	25.00	11.00
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	2.00	—	—	—	—	1.00	—	—	1.00	—
	突発性発疹	—	—	—	—	1.00	4.00	1.00	—	—	—	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	1.00	—	1.00	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00	2.00
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

第28週は川薩保健所及び出水保健所管内で手足口病が警報レベルとなっています。
また、COVID-19の定点あたりの報告数も増えています。感染対策を行い、拡げない
よう努めましょう。

手足口病について

参考資料

[手足口病](#) | [厚生労働省](#) | [厚生労働省](#)

感染経路: 飛沫感染、接触感染、糞口感染（便と一緒に排泄されたウイルスが口に入って感染すること）

※特に、手足口病にかかりやすい年齢層の乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園等では注意が必要です。

潜伏期間: 3～5日


症 状: 口の中、手のひら、足底や足の甲等に2～3mmの水疱を伴う発しんが出ます。

予防方法: 手洗いをしっかりと行い、タオルの共有は避け、排泄物を適切に処理する。

手足口病は治った後も比較的長い期間便の中にウイルスが排泄され、また、感染しても発病しないままウイルスを排泄している場合もあると考えられることから、日頃からのしっかりと手洗いが大切です。

定点あたりの報告数(手足口病)

感染症サーベイランスシステムより



鹿児島県内でも第20週から手足口病の定点あたりの報告数が警報発令基準の5.00を超えたことから、5月21日に県下に手足口病流行発生警報が発令されました。

川薩保健所では第23週から、出水保健所管内では第21週から警報レベルに達しています。

感染予防対策を行い、拡げないよう、努めましょう。

新型コロナウイルスについて

新型コロナウイルスとは


「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。

感染方法

感染者の口や鼻から、咳、くしゃみ、会話等のときに排出される、ウイルスを含む飛沫またはエアロゾルと呼ばれるさらに小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接的に接触することにより感染します。

他の人にうつすリスクについて

鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7～10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間で他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。



鹿児島県全体も5週連続で定点あたりの報告数が増加しています。

参考資料

[新型コロナウイルスに関するQ&A\(一般の方向け\) | 厚生労働省](#)