

北薩感染症情報

2026年第36週(8月31日～9月6日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎: 警報レベル

○: 注意報レベル

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開始 基準値	終 息 基準値	基準値	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 あたり 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 あたり 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点あたり報告数												
急性呼吸器感 染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	112	136	45.33	↑	—	74	73	36.50	↓	—
	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	10	5	1.67	↓	—	2	1	0.50	↓	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	—	1	0.33	↑	—	7	—	—	↓	—
小児科定点	RS	—	—	—	2	2	1.00	→	—	1	2	2.00	↑	—
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	1	1	0.50	→	—	—	1	1.00	↑	—
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	2	9	4.50	↑	—	1	4	4.00	↑	—
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	5	7	3.50	↑	—	—	1	1.00	↑	—
	水痘	2.0	1.0	1.0	—	1	0.50	↑	—	—	—	—	→	—
	手足口病	5.0	2.0	—	3	5	2.50	↑	—	—	2	2.00	↑	—
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	2	1	0.50	↓	—	—	—	—	→	—
	突発性発疹	—	—	—	1	2	1.00	↑	—	—	—	—	→	—
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	2	1	0.50	↓	—	1	1	1.00	→	—
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—	／	／	／	／	／
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	5	1	1.00	↓	—	／	／	／	／	／
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	—	—	／	→	—
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	—	—	／	→	—
報 告 数 合 計		—	—	—	145	172	／	↑	／	86	85	／	↓	／

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 結核1件
- ・出水保健所管内 なし

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

 警報レベル  注意報レベル

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				27W	28W	29W	30W	31W	32W	33W	34W	35W	36W
急性呼吸器感 染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	65.33	70.33	90.67	49.00	46.33	48.00	37.00	48.00	37.33	45.33
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	0.33	0.33	—	—	3.33	1.67
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	21.33	21.67	22.67	4.67	4.00	1.33	—	0.33	—	0.33
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	2.00	3.00	2.00	—	1.50	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	0.50	0.50	—	1.50	0.50	2.00	1.00	—	0.50	0.50
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	—	0.50	1.00	1.00	1.50	—	2.50	0.50	1.00	4.50
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	3.00	2.50	6.00	3.00	3.50	4.00	2.00	7.50	2.50	3.50
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50
	手足口病	5.00/2.00	—	12.00	9.00	2.00	2.50	—	0.50	—	—	1.50	2.50
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	1.00	0.50	1.50	1.00	1.50	—	1.50	1.00	0.50
	突発性発疹	—	—	0.50	1.00	1.50	0.50	—	0.50	0.50	1.00	0.50	1.00
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	1.00	—	—	—	0.50	—	—	1.00	0.50
眼科定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	1.00	2.00	2.00	—	1.00	1.00	2.00	5.00	5.00	1.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				27W	28W	29W	30W	31W	32W	33W	34W	35W	36W
急性呼吸器感 染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	56.00	51.00	49.00	41.00	28.00	34.50	49.50	19.50	37.00	36.50
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	—	—	—	—	—	0.50	1.00	0.50
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	9.50	15.00	9.50	1.50	0.50	2.50	1.00	2.00	3.50	—
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	—	—	2.00	3.00	4.00	1.00	4.00	—	1.00	2.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—	1.00
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	3.00	7.00	3.00	2.00	1.00	4.00	5.00	—	1.00	4.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—	—	1.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	1.00	—	1.00	1.00	1.00	2.00	—	1.00	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	25.00	11.00	3.00	1.00	—	2.00	2.00	1.00	—	2.00
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	突発性発疹	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.00	—	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	4.00	2.00	—	—	—	—	1.00	—	1.00	1.00
	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	1.00	2.00	2.00	—	1.00	1.00	2.00	5.00	5.00	1.00
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

全国的にインフルエンザの報告数が増えています。
手洗い・うがい、マスクの着用など基本的な感染対策を徹底しましょう。

インフルエンザについて


全国では、第34週時点で定点あたりの報告数が、流行開始の目安である1.00を上回る1.11となり、流行入りしました。第35週時点の定点あたりの報告数は1.76に増加し、都道府県順では、沖縄県(8.50)、岩手県(4.33)、新潟県(3.58)となっています。

鹿児島県では、第34週時点で定点あたりの報告数が1.58となり、流行開始の目安を超え、第35週の定点あたり報告数は2.32と増加しています。

基本的な感染防止対策

- ①咳エチケット
- ②アルコール製剤による手指衛生
- ③手洗い

鹿児島県内のインフルエンザ定点あたり報告数の推移
人/定点



鹿児島県感染症情報 第35週より抜粋

みんなで予防 インフルエンザ

咳エチケット

マスク、
ティッシュ・ハンカチ、
そでなどで鼻と口を
おおいましょう。



- 室内では、適度な湿度を保ちましょう。また、こまめに換気をしましょう。
- 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。



アルコール製剤による 手指衛生

インフルエンザウイルスに効果があります。

マメな手洗いと咳エチケットで
「かからない」、「うつさない」。



手洗い

指先、指の間、親指、手首は
特に注意して手洗いをしましょう。

