

北薩感染症情報

2026年第41週(10月5日～10月11日)

【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1

北薩地域振興局保健福祉環境部(川薩保健所)健康企画課

電話 0996-23-3165 FAX 0996-20-2127

E-メール kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

川薩・出水保健所における定点報告疾患

◎：警報レベル

○：注意報レベル

定点種別	対象疾患	警報レベル		注意報 レベル	川薩保健所管内					出水保健所管内				
		開 始 基準値	終 息 基準値	基準値	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 あたり 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報	前週 報告数 (人)	今週 報告数 (人)	定点 あたり 報告数	前 週 からの 増 減	警 報 注意報
		定点あたり報告数												
急性呼吸器感 染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	—	150	194	64.67	↑	—	107	122	61.00	↑	—
	インフルエンザ	30.0	10.0	10.0	15	25	8.33	↑	—	13	18	9.00	↑	—
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	—	4	2	0.67	↓	—	—	3	1.50	↑	—
小児科定点	RS	—	—	—	—	—	—	→	—	9	4	4.00	↓	—
	咽頭結膜熱	3.0	1.0	—	3	—	—	↓	—	—	—	—	→	—
	A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.0	4.0	—	5	2	1.00	↓	—	4	4	4.00	→	—
	感染性胃腸炎	20.0	12.0	—	12	18	9.00	↑	—	—	—	—	→	—
	水痘	2.0	1.0	1.0	—	3	1.50	↑	○	—	—	—	→	—
	手足口病	5.0	2.0	—	5	1	0.50	↓	—	1	2	2.00	↑	—
	伝染性紅斑	2.0	1.0	—	2	1	0.50	↓	—	—	—	—	→	—
	突発性発疹	—	—	—	1	3	1.50	↑	—	—	—	—	→	—
	ヘルパンギーナ	6.0	2.0	—	3	—	—	↓	—	1	—	—	↓	—
	流行性耳下腺炎	6.0	2.0	3.0	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
眼科定点	急性出血性結膜炎	1.0	0.1	—	—	—	—	→	—	／	／	／	／	／
	流行性角結膜炎	8.0	4.0	—	1	3	3.00	↑	—	／	／	／	／	／
基幹定点	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
	感染性胃腸炎 病原体がロタウイルスに属する	—	—	—	—	—	—	→	—	—	—	—	→	—
指定医療機関からの インフルエンザ入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	—	4	／	↑	—
指定医療機関からの COVID-19入院報告		—	—	—	—	—	／	→	—	—	—	／	→	—
報 告 数 合 計		—	—	—	201	252	／	↑	／	135	157	／	↑	／

<注意報・警報レベル>

- ・川薩保健所管内 水痘(注意報レベル)
- ・出水保健所管内 なし

<全数報告>

- ・川薩保健所管内 結核2件、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)1件
- ・出水保健所管内 なし

<インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等>

- ・川薩保健所管内 なし
- ・出水保健所管内 なし

疾病別各保健所定点当たり報告 直近10w分(男女合計)

 警報レベル  注意報レベル

定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	川薩保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				32W	33W	34W	35W	36W	37W	38W	39W	40W	41W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	48.00	37.00	48.00	37.33	45.33	52.67	56.00	30.33	50.00	64.67
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	0.33	—	—	3.33	1.67	1.67	2.33	1.67	5.00	8.33
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	1.33	—	0.33	—	0.33	—	1.00	0.67	1.33	0.67
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	1.50	1.50	1.00	1.00	1.00	—	—	—	—	—
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	2.00	1.00	—	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.50	—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	—	2.50	0.50	1.00	4.50	1.50	1.50	1.00	2.50	1.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	4.00	2.00	7.50	2.50	3.50	3.50	2.00	2.00	6.00	9.00
	水痘	2.00/1.00	1.00	—	—	—	—	0.50	0.50	0.50	—	—	1.50
	手足口病	5.00/2.00	—	0.50	—	—	1.50	2.50	—	0.50	—	2.50	0.50
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	1.50	—	1.50	1.00	0.50	0.50	—	—	1.00	0.50
	突発性発疹	—	—	0.50	0.50	1.00	0.50	1.00	—	—	—	0.50	1.50
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	0.50	—	—	1.00	0.50	2.50	2.00	1.00	1.50	—
眼科定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	急性出血性結膜炎	1.00/0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	流行性角結膜炎	8.00/4.00	—	1.00	2.00	5.00	5.00	1.00	7.00	2.00	—	1.00	3.00
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感染性胃腸炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


定点種別	疾病	警報/終息 基準値	注意報 基準値	出水保健所管内推移 (定点あたり報告数) 基幹定点(報告数掲載)									
				32W	33W	34W	35W	36W	37W	38W	39W	40W	41W
急性呼吸器 感染症(ARI) 定点	急性呼吸器感染症	—	—	34.50	49.50	19.50	37.00	36.50	47.00	41.50	25.00	53.50	61.00
	インフルエンザ	30.00/10.00	10.00	—	—	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	6.50	9.00
	COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)	—	—	2.50	1.00	2.00	3.50	—	—	0.50	—	—	1.50
小児科定点	RSウイルス感染症	—	—	1.00	4.00	—	1.00	2.00	7.00	9.00	3.00	9.00	4.00
	咽頭結膜熱	3.00/1.00	—	—	—	—	—	1.00	1.00	—	1.00	—	—
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8.00/4.00	—	4.00	5.00	—	1.00	4.00	3.00	—	—	4.00	4.00
	感染性胃腸炎	20.00/12.00	—	—	—	—	—	1.00	2.00	—	—	—	—
	水痘	2.00/1.00	1.00	2.00	—	1.00	—	—	—	—	—	—	—
	手足口病	5.00/2.00	—	2.00	2.00	1.00	—	2.00	6.00	4.00	—	1.00	2.00
	伝染性紅斑	2.00/1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	突発性発疹	—	—	1.00	1.00	—	—	—	—	1.00	—	—	—
	ヘルパンギーナ	6.00/2.00	—	—	1.00	—	1.00	1.00	1.00	6.00	—	1.00	—
基幹定点	流行性耳下腺炎	6.00/2.00	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基幹定点	感染性胃腸炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	病原体がロタウイルスに限る	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

全国的にインフルエンザの報告数が増えています。川薩保健所管内では水痘が流行発生注意報レベルです。手洗い・うがい、マスクの着用など基本的な感染対策を徹底しましょう。

鹿児島県内にインフルエンザ 流行発生注意報が発令されました！

鹿児島県内では、第40週での定点当たりの報告数が**10.58**となり、注意報発令基準の**10.00**を超えたことから、10月8日に**インフルエンザ流行発生注意報**を発令しました。今後、大きな流行が発生する可能性もあるため、注意が必要です。

保健所別では、名瀬保健所(23.60)、大口保健所(18.50)、鹿児島市保健所(12.71)の順に多くなっています。



基本的な感染防止対策

- ①咳エチケット
- ②アルコール製剤による手指衛生
- ③手洗い

鹿児島県感染症情報 第40週報より抜粋
鹿児島県内のインフルエンザ定点当たり報告数の推移

みんなで予防 インフルエンザ

マメな手洗いと咳エチケットで
「かからない」、「うつさない」。

- 室内では、適度な湿度を保ちましょう。また、こまめに換気をしましょう。
- 十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。

咳エチケット

マスク、
ティッシュ・ハンカチ、
そでなどで鼻と口を
おおいましょう。



アルコール製剤による 手指衛生

インフルエンザウイルスに効果があります。



手洗い

指先、指の間、親指、手首は
特に注意して手洗いをしましょう。



水痘について

参考資料

[水痘 | 厚生労働省](#)

[水痘 | 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト](#)

水痘とは

いわゆる「みずぼうそう」のことで、**水痘帯状疱疹ウイルス**によって引き起こされる、かゆみを伴う発しんが全身に出現する感染症です。水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めるといわれています。

症状

発しんの発現する前から発熱が認められ、発しんは紅斑（皮膚の表面が赤くなること）から始まり、水疱（水ぶくれ）、膿疱（粘度のある液体が含まれる水疱）を経て痂皮化（かさぶたになること）して治癒するとされています。

感染経路

空気感染、飛まつ感染、接触感染によって拡がります。

家庭のほか、学校などの施設内でも感染の伝播がみられます。潜伏期間は長く、2週間程度（10日～21日）くらいとされています。

予防と対策

現在国内では**乾燥弱毒生水痘ワクチン**が用いられています。

水痘ワクチンの1回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。（平成26年10月から2回の定期接種が導入）

家庭内接触での発症率は90%と報告されており、家庭内での感染を防ぐために水疱に触れた後の確実な手洗いやタオルの共有を避けることも重要です。

川薩保健所管内で注意報レベルに達しています。

定点当たりの報告数は1.5で、年齢別では、10～14歳が2名、4歳が1名でした。発しんなどの症状が出現し水痘を疑う場合、医療機関に電話などで水痘の疑いがあることを伝え、医療機関の指示を仰ぐようにしましょう。