

飼料用とうもろこし

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
アルファード液剤	トブ ラメゾン	一年生雑草	とうもろこし3～7葉期 但し、収穫45日前まで	雑草茎葉散布又は 全面散布
エコトップ乳剤 (注1)	ジメナトド・リニユロン	一年生雑草	は種後出芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
グリホエキス液剤	グリホサートイソプロピルアミン塩	一年生及び多年 生雑草	耕起前又はは種前まで(雑草生育 期)	雑草茎葉散布
ゲザノンゴールド	アトラジン・S-メトラクロール	一年生雑草	マルチ前、は種前(雑草発生前)、 は種後発芽前(雑草発生前)、 生育期(とうもろこし2～4葉期)	全面土壌散布
ゲザプリムフロアブル (注2)	アトラジン	一年生雑草	は種後～とうもろこし2～4葉期ま で	全面土壌散布及び 雑草茎葉散布
サンフーロン液剤	グリホサートイソプロピルアミン塩	一年生及び多年 生雑草	耕起前又はは種前まで(雑草生育期) は種後出芽前まで(雑草生育期)	雑草茎葉散布
シャドー水和剤	ハロスルフロメチル	キクイモ 一年生及び多年 生広葉雑草	キクイモ生育期(とうもろこし5葉期) 一年生及び多年生広葉雑草2～5葉 期(とうもろこし3～5葉期)	雑草茎葉散布又は 全面散布
デュアールゴールド	S-メトラクロール	一年生イネ科雑草 一年生雑草	本葉1～2葉期(イネ科雑草2葉期ま で) は種後出芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
バサグラン液剤(ナトリウム塩)	ペンタゾナトリウム塩	一年生雑草(イ ネ科を除く)	生育期 但し、収穫50日前まで	雑草茎葉散布又は 全面散布
ブルーシアフロアブル	トルビラレート	一年生雑草	とうもろこし3～5葉期 但し収 穫45日前まで	雑草茎葉散布また は全面散布
モーティブ乳剤 (注3)	ジメナトド・P・ペンテメタリン	一年生雑草	は種後～とうもろこし2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)	全面土壌散布
ラウンドアップマックスロード	グリホサートカリウム塩	一年生及び多年 生雑草	飼料用とうもろこし出芽前まで (雑草生育期)	雑草茎葉散布
ラッソー乳剤 (注4)	アラクロール	一年生雑草 一年生イネ科雑草	は種後出芽前 生育期1～2葉期 (イネ科雑草2葉期まで)	雑草茎葉散布又は 全面土壌散布
ワンホープ乳剤 (注5)	ニコスルロン	一年生雑草及び 多年生イネ科雑草	とうもろこし3～5葉期 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布又は 全面散布
(注意事項) (注1) 砕土、整地は丁寧に行い覆土深は2～3cm 以上とする。適用土壌は砂土を除く全土壌。 (注2) 適用土壌は砂土を除く全土壌。 (注3) 適用土壌は砂土を除く全土壌。 (注4) ラッソー乳剤とゲザプリムフロアブルの混用はイネ科・広葉雑草が共に多い場合に使用し、薬液混合は散布当日に行 う。 (注5) 高温(気温 30℃以上)、乾燥条件では使用しない。適用品種があるので、適用品種以外には使用しない。				

飼料用さとうきび

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
アージラン液剤	アジュラム	一年生及び多年 生雑草	雑草生育期(草丈15cm以下) 但し、収穫30日前まで	雑草茎葉散布又は 全面散布
カーメックス顆粒水和剤	DCMU	一年生雑草	【株出】 萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
		一年生及び多年 生広葉雑草	【株出】 雑草生育期 但し、収穫90日前まで	雑草茎葉散布
		一年生雑草	【春植又は夏植】 植付覆土後(雑草発生前)	全面土壌散布
		一年生及び多年 生広葉雑草	【春植又は夏植】 雑草生育期 但し、収穫90日前まで	雑草茎葉散布
シャドー水和剤	ハロスルフロメチル	一年生広葉雑草 ハマスゲ	一年生広葉雑草3～5葉期(さとう きび生育初期)但し、収穫90日前 まで ハマスゲ3～5葉期 但し収穫90日前まで	雑草茎葉散布又は 全面散布
センコル水和剤	メトリブジン	一年生雑草、 ムラサキカタバ ミ	【休田】 萌芽45日後まで(雑草2葉期ま で)	全面土壌散布
			【株出】 収穫45日前まで(雑草2葉期ま で)	雑草茎葉散布
			【春植又は夏植】 植付直後～植付45日後まで (雑草2葉期まで)	全面土壌散布 雑草茎葉散布

飼料用さとうきび（つづき）

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ダイロンゾル	DCMU	一年生雑草及び多年生広葉雑草	【株出】 萌芽前(雑草発生前)	土壌散布
			【株出】 萌芽前(雑草発生前), 生育期(雑草生育期) 但し、収穫75日前まで	雑草茎葉散布又は 全面土壌散布
			【春植又は夏植】 植付後萌芽前(雑草発生前)	土壌散布
			【春植又は夏植】 植付後萌芽前(雑草発生前), 生育期(雑草生育期) 但し、収穫75日前まで	雑草茎葉散布又は 全面土壌散布
ラウンドアップマックスロード	グリホサートカリウム塩	一年生雑草及び多年生雑草	耕起前又は植付前まで (雑草生育期)	雑草茎葉散布
2, 4-Dアミン塩	2,4-PAジメチルアミン	一年生及び多年生広葉雑草	植付後又は株出管理後30日以降雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫90日前まで	雑草茎葉散布

ソルガム

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
ゲザノンゴールド	アトラジン・S-メトラクロール	一年生雑草	は種直後	全面土壌散布
ゲザプリムフロアブル (注1)	アトラジン	一年生広葉雑草	は種後(雑草発生前～始期)	全面土壌散布及び 雑草茎葉散布
ゴーゴーサン乳剤	ペテメタリン	一年生雑草	ソルガム3葉期(雑草発生前～発生始期)	雑草茎葉散布又は 全面土壌散布
			は種後出芽前(雑草発生前)	全面土壌散布
バサグラン液剤	ベンタジントリウム塩	一年生雑草(イネ科を除く)	生育期 ただし収穫30日前まで	雑草茎葉散布又は 全面散布
ラウンドアップマックスロード	グリホサートカリウム塩	一年生雑草	耕起前又はは種前まで	雑草茎葉散布
ロロックス	リニロン	一年生雑草	播種直後(雑草発生前)	全面土壌散布
(注意事項) (注1) 適用土壌は砂土を除く全土壌。				

牧草

農薬の名称	成分	適用雑草名	使用時期	使用方法
アージラン液剤 (注1)	アシェラム	ギンギン類及びキク科の雑草	秋～春期(9～5月) ギンギン類の展葉時期 但し、採草14日前まで	雑草茎葉散布又は 全面散布
		ワラビ	早春～秋期(1～11月) ギンギン類の展葉時期	雑草茎葉散布 (局所処理)
ハーモニー75DF (注2)	チフェンスルフロンメチル	ギンギン類, 一年生広葉雑草	雑草生育期 但し、採草21日前まで	雑草茎葉散布又は 全面散布
		ギンギン類	新播草地定着後 (但し、ギンギン類草丈20cm以下) 但し、採草21日前まで	
バンベレーD液剤	MDBAジメチルアミン	ギンギン	秋期最終刈取後30日以内	雑草茎葉散布
ラウンドアップマックスロード (注3)	グリホサートカリウム塩	一年生及び多年生雑草	耕起前まで(雑草生育期), 耕起整地後～は種当日まで (雑草発生前)	雑草茎葉散布
(注意事項) (注1) 夏期の散布は薬害が生じることがあるので避ける。 (注2) クローバーには薬害がある。 (注3) 非選択性の除草剤である。				