

1. 作物別奨励品種特性

区分	種別	早晩性	品 種 名	来 歴	採用年度	移植期	出穂期	成熟期	稈長	穂長	穂数	芒の長短	ふ先の色	草型	耐倒伏性	脱粒の難易	玄 米			玄米の品質	玄米重	もみすり歩合	穂発芽難易	耐病性			耐冷性	適 地	特 性 概 要	備 考 (園芸作物部成績)
																	腹白	心白	千粒重					葉いもち	穂いもち	白葉枯病				
						月.日	月.日	月.日	cm	cm	本/m ²								g	kg/10a	%									
早期（本土）	うるち	早	コシヒカリ	農林22号／農林1号 （福井農試育成）	昭和36	4.1	6.19	7.23	78	16.8	500	極短	黄白	偏穂数	弱	難	極微／微	無／微	19.7	上 の 下	478	77.0	難	やや弱	やや弱	中	極強	本土全域	良質・良食味，耐倒伏性弱，いもち病にやや弱	平成27～令和6年
		中	イクヒカリ	越南148号／ 北陸148号（どんとこい） （福井農試育成）	平成15	4.1	6.22	7.28	69	17.3	441	極短	黄白	中間	強	難	極微／微	無／微	21.4	上 の 下	555	81.1	難	－	－	中	やや弱	本土全域	多収，良質・良食味，耐倒伏性強，いもち病真性抵抗性 <i>Pita-2</i>	平成27～令和6年
		中	西南177号	西南164号／ 西南165号 （鹿児島農総センター育成）	令和6	3.30	6.20	7.24	67	17.3	467	無	黄白	中間	やや強	難	無／極微	無／微	20.5	上 の 中	591	80.0	やや難	強	強	－	やや弱	本土全域	多収，良質・良食味，高温登熟性やや強，いもち病ほ場抵抗性遺伝子 <i>Pi39</i> ， <i>Pbi1</i> ，縞葉枯病抵抗性遺伝子 <i>Stvb-i</i>	令和4～令和6年
		晩	なつほのか	西南115号／ 西海250号（にこまる） （鹿児島農総センター育成）	平成30	4.1	6.30	8.5	71	18.3	479	短	黄白	中間	強	難	無／極微	無／微	22.5	上 の 中	619	80.0	難	やや弱	やや弱	やや弱	弱	本土全域	多収，良質，良食味，耐倒伏性強，いもち病にやや弱	平成27～令和6年
	もち	中	峰の雪もち	奥羽302号／ヒメノモチ （中央農研北陸研究センター育成）	平成6	4.1	6.24	7.27	63	17.2	387	無	黄白	偏穂重	強	難	－	－	22.8	上 の 下	501	82.2	やや難	中	やや弱	中	中	本土全域	多収，良質，耐倒伏性強，ふ先の色黄白，穂いもち病にやや弱	平成23～27年

区分	種別	早晩性	品 種 名	来 歴	採用年度	移	出	成	稈	穂	穂	芒の長短	ふ先色	草型	耐倒伏性	脱粒の難易	玄米			玄米の品質	玄米重	もみすり歩合	穂発芽難易	耐病性			耐冷性	適 地	特 性 概 要	備 考 (熊毛支場成績)
						植	穂	熟	長	長	数						腹白	心白	千粒重					葉いもち	穂いもち	白葉枯病				
早期（熊毛）	うるち	中	コシヒカリ	農林22号／農林1号 (福井農試育成)	昭和57	月、日 3. 23	月、日 6. 10	月、日 7. 12	cm 67	cm 15. 2	本/m ² 416	極短	黄白	穂数	弱	難	無	無く微	20. 3	上 の 下	kg/10a 443	% 80. 0	難	やや弱	やや弱	中	極強	熊毛全域	良質，穂発芽難，耐倒伏性弱，葉いもち病やや弱い	令和4～令和6年
		中	イクヒカリ	越南148号／北陸148号(どんとこい) (福井農試育成)	平成15	3. 23	6. 15	7. 16	60	16. 2	380	極短	黄白	中間	強	難	無く微	無く微	22. 1	中 の 中	499	81. 0	難	－	－	中	やや弱	熊毛全域 (早植地帯を除く)	耐倒伏性強，いもち病真性抵抗性 (<i>Pita-2 Pii</i>) ，耐冷性やや弱	令和4～令和6年
		中	西南177号	西南164号／西南165号 (鹿児島農総センター育成)	令和6	3. 23	6. 15	7. 15	62	16. 9	385	無	黄白	中間	やや強	難	無く微	無く微	22. 1	中 の 上	503	82. 4	やや難	強	強	－	やや弱	熊毛全域 (早植地帯を除く)	多収，良質・良食味，高温登熟性やや強，いもち病ほ場抵抗性遺伝子 <i>Pi39</i> , <i>Pb1</i> ，縞葉枯病抵抗性遺伝子 <i>Stvb-i</i>	令和4～令和6年
		晩	なつほのか	西南115号／西海250号(にこまる) (鹿児島農総センター育成)	平成30	3. 24	6. 25	7. 28	62	18. 6	424	短	黄白	中間	強	難	無く微	無く微	23. 4	上 の 下	574	80. 8	難	やや弱	やや弱	やや弱	弱	熊毛全域 (早植地帯を除く)	多収，良食味，高温登熟性優れる，耐倒伏性強，いもち病やや弱	令和2～令和6年
	もち	中	峰の雪もち	奥羽302号／ヒメノモチ (中央農研北陸研究センター育成)	平成6	3. 26	6. 21	7. 23	63	17. 1	364	無	黄白	偏穂重	強	難	－	－	23. 7	上 の 下	512	81. 2	やや難	中	やや弱	中	中	熊毛全域	多収，良質，耐倒伏性強	平成21～25年

区分	種別	早晩性	品 種 名	来 歴	採用年度	移植期	出穂期	成熟期	穂長	穂長	穂数	芒の長短	ふ先色	草型	耐倒伏性	脱粒の難易	玄 米			玄米の品質	玄米重	もみすり歩合	耐病性			適 地	特 性 概 要	備 考 (園芸作物部成績)
																	腹白	心白	千粒重				葉いもち	穂いもち	白葉枯病			
普通期（本土）	うるち	早	ヒノヒカリ	愛知40号（黄金晴） ／コシヒカリ （宮崎総合農試育成）	平成元	月.日 6.18	月.日 8.20	月.日 9.30	cm 79	cm 19.7	本/m ² 389	極短	黄白	中間	やや弱	難	無	無 く 微	g 21.5	上 の 下	kg/10a 538	% 80.0	やや弱	やや弱	やや弱	本土全域	良食味，耐倒伏性 やや弱，いもち病 にやや弱	平成27～令和6年
		早 く 中	あきの舞	西南136号（なつほのか） ／関東263号 （鹿児島農総センター育成）	令和4	6.18	8.22	10.4	81	20.4	374	極短	黄白	中間	やや弱	難	無 く 微	無 く 微	22.9	上 の 中	585	79.9	強	中	やや強	本土全域	良食味，多収， 良質，葉いもち強 トイロウカ抵抗性 (<i>bph11</i>)	令和元～6年
		中 く 晩	あきほなみ	（南海107号／西海201号） F 6／越南179号 （鹿児島農総センター育成）	平成19	6.18	9.1	10.14	77	19.3	398	極短	黄白	中間	やや強	難	無 く 微	無 く 微	24.1	上 の 中	596	80.4	－	－	やや強	本土全域	極良食味，多収， いもち病真性抵抗 性 <i>Pita-2</i>	平成27～令和6年
		晩	あきのそら	K G 146／西南115号 （鹿児島農総センター育成）	平成27	6.18	9.7	10.22	73	18.4	445	極短	黄白	中間	強	難	無	無 く 微	21.6	上 の 中	576	78.2	－	－	やや強	本土全域	良質・良食味，多 収，耐倒伏性強， いもち病真性抵抗 性不明	平成26～令和6年 ※平成28年除く

区分	種別	早晩性	品 種 名	来 歴	採用年度	移植期 月・日	出穂期 月・日	成熟期 月・日	稈長 cm	穂長 cm	穂数 本/m ²	芒の長短	ふ先色	草型	耐倒伏性	脱粒の難易	玄 米			玄米の品質	玄米重 kg/10a	もみすり歩合 %	耐病性			適 地	特 性 概 要	備 考 (園芸作物部成績)
																	腹白	心白	千粒重 g				葉いもち	穂いもち	白葉枯病			
普通期(本土)	も	中	さつま絹もち	サイワイモチ/02交母55 (峰の雪もち/KG糯102のF6) (鹿児島農総センター育成)	平成23	6.18	8.29	10.9	77	17.6	377	極短	紫	中間	やや強	難	—	—	20.3	上 の 下	551	80.4	—	—	やや強 く 中	本土全域	中生，脱粒性難，良質糯，いもち病真性抵抗性 <i>Pita-2</i> ，もちの硬化速度が速い	平成22年， 平成24～27年
	ち	晩	さつま雪もち	峰の雪もち／ KG糯102号(さつま白もち) (鹿児島農総センター育成)	平成17	6.18	9.11	10.25	77	19.1	357	短	紫	偏穂重	強	難	—	—	21.1	上 の 下	570	80.2	—	—	中	本土全域	多収，良質糯，耐倒伏性強，いもち病真性抵抗性 <i>Pita-2</i> ，脱粒性難，もちの硬化速度が遅い	平成22年， 平成24～27年