

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)									発病・発生数 (%、頭、枚)				備考			
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	1㎡当り	虫数	本年		評価	平年	
○ チャノコカク モンハマキ	やや少	並	南薩	0	0	1					100	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.04)		
		並	北薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	虫数	北薩	0.0	並		(0)
		並	大隅	0	0	3					100	0	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並		(0.04)
		やや少	県計	0	0	1					100	0	3	0	0	7	0	0	3	0	0		県平均	0.0	やや少	(0.03)		
○ チャハマキ	やや少	やや少	南薩	0	0	4					100	0	0	0	6	0	6	0	6	22	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.00)		
		並	北薩	0	0	3					100	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20		虫数	北薩	0.0	並		(0)
		並	大隅	0	0	1					100	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.22)		
		やや少	県計	0	0	3					100	0	0	0	4	0	7	0	3	15	4		県平均	0.0	並	(0.05)		
○ チャノホソガ	多	並	南薩	289	6	8				6	94	0	6	0	0	19	0	18	29	0	6	1㎡当り	南薩	0.1	並	(0.2)	少：枕崎1，末吉1，鹿屋2，錦江2	
		並	北薩	148	10	9				10	90	0	0	0	0	0	20	0	20	30	20		巻葉数	北薩	0.3	多		(0.02)
		多	大隅	971	50	10				50	50	0	25	38	0	0	13	13	13	0			大隅	1.0	多	(0.1)		
		多	県計	1,407	17	9				17	83	0	10	9	0	11	4	13	24	9	7		県平均	0.3	多	(0.1)		
○ チャノミドリ ヒメヨコバイ	並	やや多	南薩	1,733	38	29				38	63	13	31	38	19	56	13	35	35	17	29	4ヶ所叩き	南薩	0.6	やや多	(0.3)	少：顔娃(青戸)1，知覧(菊永)2，川辺1，加世田1，枕崎1，出水1，有明(野井倉)1	
		少	北薩	148	10	30				10	90	20	20	10	10	30	30	40	50	40	50		落とし虫数	北薩	0.1	やや少		(0.4)
		やや少	大隅	243	13	26				13	88	13	50	38	13	25	0	13	38	38	38		大隅	0.3	並	(0.4)		
		並	県計	2,124	26	28				26	74	14	34	33	16	44	13	30	39	26	35		県平均	0.4	並	(0.4)		
○ チャノキイロ アザミウマ	少	少	南薩	0	0	22					100	19	31	44	38	25	0	29	12	0	18	4ヶ所叩き	南薩	0.0	少	(1.4)	少：溝辺1，有明(野井倉)1，錦江1	
		やや少	北薩	148	10	26				10	90	50	40	40	40	10	30	10	0	20	20		落とし虫数	北薩	0	少		(1.9)
		並	大隅	485	25	33				25	75	25	13	0	63	38	25	50	38	38	38		大隅	0.4	やや少	(1.0)		
		少	県計	633	8	25				8	92	26	28	32	44	25	12	31	16	13	23		県平均	0.1	少	(1.4)		
○ カンザワハダニ	並	並	南薩	578	13	21				13	88	6	13	31	38	13	56	18	6	17	12	寄生葉率	南薩	0.2	やや少	(4.9)	中：湧水1，末吉1 少：顔娃(谷場)1，知覧(後岳)1，さつま1，出水1，溝辺1，牧園1，有明(原田)1，鹿屋2	
		並	北薩	1,036	70	68			20	50	30	30	40	60	90	70	60	70	80	80	100		北薩	5.0	並	(6.5)		
		並	大隅	728	38	48				38	63	38	25	0	100	75	63	25	38	75	38		大隅	0.4	やや少	(5.5)		
		並	県計	2,342	29	36			4	25	71	18	21	29	63	38	58	28	27	42	34		県平均	1.6	やや少	(5.5)		
チャトゲコナ ジラミ	-	-	南薩	1,155	25	-			6	19	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	寄生葉率	南薩	1.3	-	-	中：加世田1，湧水1，錦江1 少：顔娃(谷場)1，知覧(後岳)1，川辺1，さつま1，溝辺1，牧園1，末吉2，錦江1	
		-	北薩	888	60	-			30	30	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		北薩	5.8	-	-		
		-	大隅	243	13	-				13	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		大隅	2.1	-	-		
		-	県計	2,286	28	-			9	19	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		県平均	2.8	-	-		

※その他特記事項

南薩：薩摩中南部 4,621ha 8地点16ほ場 【南九州市顔娃町牧之内(谷場)②・顔娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】
 北薩：川内川中流域・霧島山麓 1,480.6地点10ほ場 【南さつま市加世田内山田(東山)②・枕崎市別府(中原)②・日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】
 大隅：大隅中南部 1,941ha 4地点8ほ場 【さつま町船木(舟木)②・出水市平和町②・霧島市溝辺町麓(論地)②・霧島市牧園町三休堂①・湧水町木場①・置於市末吉町岩崎②】
 県計(能毛・大島除く) 8,042ha (R4 19地点35ほ場) 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②・鹿屋市東原町②・錦江町城元②】

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。