

病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)												発病・発生数 (%, 頭, 枚)					備 考
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	評価	平年			
炭疽病	-	-	南薩	0	0	-					100												1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.0)		
		-	北薩	0	0	-					100												病葉数	北薩	0.0	並	(0.0)		
		-	大隅	0	0	-					100													大隅	0.0	並	(0.0)		
		-	県計	0	0	-					100													県平均	0.0	並	(0.0)		
○ チャノコカク モンハマキ	やや少	並	南薩	0	0	1					100	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.04)		
		並	北薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	虫数	北薩	0.0	並	(0)		
		並	大隅	0	0	3					100	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	大隅	0.0	並	(0.04)		
		やや少	県計	0	0	1					100	3	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	0	県平均	0.0	やや少	(0.03)		
○ チャハマキ	やや少	やや少	南薩	0	0	4					100	0	0	6	0	6	0	6	22	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.00)			
		並	北薩	0	0	3					100	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	虫数	北薩	0.0	並		(0)	
		並	大隅	0	0	1					100	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	大隅	0.0	並		(0.22)	
		やや少	県計	0	0	3					100	0	0	4	0	7	0	3	15	4	0	0	0	県平均	0.0	並		(0.05)	
○ チャノホソガ	やや少	やや少	南薩	0	0	8					100	6	0	0	19	0	18	29	0	6	6	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.2)	少：牧園1，湧水1，錦江2		
		やや多	北薩	296	20	10				20	80	0	0	0	0	20	0	20	30	20	10	10	巻葉数	北薩	0.4	多		(0.02)	
		並	大隅	243	13	15				13	88	25	38	0	0	0	13	13	13	0	50	50	大隅	0.1	並	(0.1)			
		やや少	県計	539	7	10				7	93	10	9	0	11	4	13	24	9	7	17	17	県平均	0.1	並	(0.1)			
○ チャノミドリ ヒメヨコバイ	やや少	やや少	南薩	866	19	31				19	81	31	38	19	56	13	35	35	17	29	38	4ヶ所叩き	南薩	0.3	並	(0.3)	少：知覧(後岳)2，川辺1，出水1，有明(野井倉)1，錦江2		
		やや少	北薩	148	10	29				10	90	20	10	10	30	30	40	50	40	50	10	10	落とし虫数	北薩	0.5	並		(0.4)	
		やや多	大隅	728	38	26				38	63	50	38	13	25	0	13	38	38	38	13	13	大隅	0.9	やや多	(0.4)			
		やや少	県計	1,742	22	29				22	78	34	33	16	44	13	30	39	26	35	26	26	26	県平均	0.5	やや多		(0.4)	
○ チャノキイロ アザミウマ	やや少	やや少	南薩	289	6	20				6	94	31	44	38	25	0	29	12	0	18	0	4ヶ所叩き	南薩	0.1	やや少	(1.4)	少：川辺1，錦江2		
		少	北薩	0	0	22					100	40	40	40	10	30	10	0	20	20	10	10	落とし虫数	北薩	0	少		(1.9)	
		並	大隅	485	25	33				25	75	13	0	63	38	25	50	38	38	38	25	25	大隅	0.4	やや少	(1.0)			
		やや少	県計	774	10	23				10	90	28	32	44	25	12	31	16	13	23	8	8	県平均	0.1	少	(1.4)			
○ カンザワハダニ	並	多	南薩	2,022	44	21				44	56	13	31	38	13	56	18	6	17	12	13	寄生葉率	南薩	0.8	やや少	(4.9)	少：頤娃(谷場)1・頤娃(青戸)1，知覧(菊永)1，知覧(後岳)2，枕崎1，伊集院1，さつま1，出水1，牧園1，末吉2，有明(原田)1，鹿屋2		
		少	北薩	740	50	72				50	50	40	60	90	70	60	70	80	80	100	70	70	北薩	3.6	並	(6.5)			
		並	大隅	728	38	48				38	63	25	0	100	75	63	25	38	75	38	38	38	大隅	1.6	やや少	(5.5)			
		並	県計	3,490	43	37				43	57	21	29	63	38	58	28	27	42	34	29	29	県平均	1.8	やや少	(5.5)			
チャトゲコナ ジラミ	-	-	南薩	1,733	38	-				38	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	寄生葉率	南薩	1.1	-	-	多：牧園1 中：さつま1，出水1 少：川辺2，加世田2，枕崎2，伊集院1，さつま1，出水1，溝辺2，末吉2，有明(野井倉)1，有明(原田)1，鹿屋1，錦江2		
		-	北薩	1,332	90	-		10	20	60	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60		北薩	10.5	-		-	
		-	大隅	1,213	63	-				63	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		大隅	2.9	-		-	
		-	県計	4,278	53	-		2	4	48	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28		県平均	4.3	-		-	

※その他特記事項

南薩：薩摩中南部 4,621ha 8地点16ほ場 【南九州市頤娃町牧之内(谷場)②・頤娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】
北薩：川内川中流域・霧島山麓 1,480ha 6地点 10ほ場 【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(輪地)②、霧島市牧園町三休堂①、湧水町木場①、曾於市末吉町岩崎②】
大隅：大隅中南部 1,941ha 4地点 8ほ場 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町城元②】
県計(熊本・大島除く) 8,042ha (R4) 18地点34ほ場

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。