

作物名	病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生は場率 (%)			発生程度 (%)					年次別 発生は場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)					備 考		
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	前年	評価		平年	
サトウキビ	黒穂病	多	多	奄美	641	8	4	1				8	92	0	0	0	0	4	2	0	0	4	4	100株当り 発病株率	奄美	0.1	0.2	並	(0.06)	喜界島：少3 沖永良部島：少1	
		並	並	熊毛	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100株当り 発病株率	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)		
サトウキビ	葉焼病	並	並	奄美	1,122	14	28	13				14	86	8	2	22	7	8	14	8	12	24	28	5茎当り 病斑面積	奄美	0.7	1.0	並	(0.9)	奄美大島：少3 徳之島：少4	
		並	並	熊毛	0	0	0	4					100	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	5茎当り 病斑面積	熊毛	0.0	0.0	並	(0.04)		
サトウキビ	さび病	やや多	並	奄美	2,564	32	44	25			4	28	68	22	16	24	0	18	10	12	50	54	44	5茎当り 病斑面積	奄美	3.2	2.2	やや多	(1.6)	奄美大島：少5 喜界島：中1, 少3 徳之島：中1, 少3 沖永良部島：少3	
		多	多	熊毛	1,970	80	60	14		20	20	40	20	0	0	0	0	0	20	0	0	60	60	5茎当り 病斑面積	熊毛	21.6	3.0	多	(0.42)		
サトウキビ	カンシヤコバナ ナガカメムシ	やや少	やや少	奄美	5,930	74	90	85				74	26	74	40	88	93	92	94	100	88	90	90	5葉当り 吸汁痕数	奄美	0.6	2.3	少	(2.7)	奄美大島：少23 喜界島：少4 徳之島：少5 沖永良部島：少1 与論島：少4	
		やや多	やや多	熊毛	1,970	80	20	58				80	20	100	100	80	60	40	40	60	0	80	20	5葉当り 吸汁痕数	熊毛	3.8	0.6	多	(0.9)		
サトウキビ	メイチュウ類	やや多	並	奄美	6,091	76	77	77		1	12	63	24	79	91	81	69	67	77	83	76	72	77	20株当り 被害茎率	奄美	2.4	2.6	やや少	(3.2)	奄美大島：中9, 少21 喜界島：少10 徳之島：多1, 少5 沖永良部島：少6 与論島：少5	
		多	多	熊毛	1,477	60	30	30					60	40	20	30	30	20	50	40	50	10	20	30	20株当り 被害茎率	熊毛	1.2	0.5	多	(0.4)	
サトウキビ	ツマジロクサヨトウ	一	一	奄美	82	3	3	3					3	97								6	3	5	20株当り 新葉部 被害率	奄美	0.1	0.1	やや少	(0.2)	奄美大島1, 徳之島1
		一	一	熊毛	0	0	0	0					100									0	0	0	20株当り 新葉部 被害率	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)	

※その他特記事項	
【サトウキビ】R7.6.11～20調査	
●調査地点	
サトウキビ	8,014ha（夏植え:821ha, 春植え:1,111ha, 株出し:5,254ha, 新植夏植え:828ha）50ほ場調査【奄美大島30, 喜界島5, 徳之島5, 沖永良部5, 与論島5】
	但し、メイチユウ類については防除員による調査ほ場は各島10ほ場の計75ほ場 ツマジロクサヨトウについては防除員の調査は奄美大島, 沖永良部島, 与論島は各5ほ場, 喜界島, 徳之島は各10ほ場の計60ほ場
※栽培面積 サトウキビ:「令和5年産さとうきび及び甘しゅ糖生産実績」（令和6年9月 県農産園芸課）から出典	

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。