

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年(令和7年)6/12~25日調査

| 病害虫名 | 総合概評 | 概評 | 地域 | 発生面積 (ha) | 発生ほ場率 (%) | | 発生程度 (%) | | | | | 年次別 発生ほ場率 (%) | | | | | | | | 発病・発生数 (%、頭、枚) | | | | 備考 | | | |
|------|------|-----|----|-----------|-----------|----|----------|---|---|----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|-----|-----|-------|--|
| | | | | | 本年 | 平年 | 甚 | 多 | 中 | 少 | 無 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | 1㎡当り | 南薩 | | 本年 | 評価 | 平年 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○炭疽病 | 並 | 並 | 南薩 | 2,022 | 44 | 50 | | | | 44 | 56 | 50 | 56 | 38 | 50 | 31 | 88 | 41 | 53 | 53 | 38 | 1㎡当り | 南薩 | 3.8 | 並 | (4.0) | 少：顛娃(谷場)1, 知覧(後岳)1, 川辺1, 加世田2, 伊集院2, さつま2, 出水1, 溝辺2, 牧園1, 湧水1, 有明(原田)2 |
| | | 並 | 北薩 | 1,036 | 70 | 60 | | | | 70 | 30 | 40 | 70 | 20 | 70 | 20 | 60 | 80 | 100 | 70 | 70 | 病葉数 | 北薩 | 5.8 | 並 | (4.2) | |
| | | やや少 | 大隅 | 485 | 25 | 43 | | | | 25 | 75 | 25 | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 38 | 50 | | 大隅 | 2.0 | 並 | (1.7) | |
| | | 並 | 県計 | 3,543 | 44 | 50 | | | | 44 | 56 | 42 | 60 | 25 | 57 | 22 | 77 | 53 | 64 | 52 | 46 | | 県平均 | 4.0 | 並 | (3.5) | |
| ○輪斑病 | やや多 | 多 | 南薩 | 1,155 | 25 | 12 | | | | 25 | 75 | 19 | 19 | 0 | 13 | 6 | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 | 1㎡当り | 南薩 | 0.4 | 並 | (0.9) | 少：知覧(後岳)2, 加世田1, 伊集院1, さつま1, 有明(原田)2 |
| | | やや少 | 北薩 | 148 | 10 | 32 | | | | 10 | 90 | 50 | 10 | 20 | 20 | 10 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 病葉数 | 北薩 | 0.6 | 並 | (0.7) | |
| | | やや多 | 大隅 | 485 | 25 | 14 | | | | 25 | 75 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 大隅 | 1.5 | 並 | (1.6) | |
| | | やや多 | 県計 | 1,789 | 22 | 16 | | | | 22 | 78 | 23 | 16 | 4 | 11 | 5 | 25 | 22 | 24 | 13 | 15 | | 県平均 | 0.7 | 並 | (1.1) | |
| もち病 | 並 | 並 | 南薩 | 289 | 6 | 5 | | | | 6 | 94 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 1㎡当り | 南薩 | 0.2 | 並 | (0.3) | 少：知覧(後岳)1 |
| | | やや少 | 北薩 | 0 | 0 | 5 | | | | | 100 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 病葉数 | 北薩 | 0.0 | やや少 | (0.4) | |
| | | 並 | 大隅 | 0 | 0 | 6 | | | | | 100 | 13 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 大隅 | 0.0 | 並 | (0.6) | |
| | | 並 | 県計 | 289 | 4 | 5 | | | | 4 | 96 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | | 県平均 | 0.1 | 並 | (0.5) | |

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年(令和7年)6/12~25日調査

| 病害虫名 | 総合概評 | 概評 | 地域 | 発生面積 (ha) | 発生ほ場率 (%) | | 発生程度 (%) | | | | | 年次別 発生ほ場率 (%) | | | | | | | | 発病・発生数 (%、頭、枚) | | | | 備考 | | | | |
|-------------------|------|-----|----|-----------|-----------|----|----------|---|----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|-------|-----|--------|--------|---|--|--------|
| | | | | | 本年 | 平年 | 甚 | 多 | 中 | 少 | 無 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | | | | 本年 | 評価 | 平年 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1㎡当り |
| ○チャノコカク モンハマキ | 多 | 多 | 南薩 | 578 | 13 | 3 | | | | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1㎡当り | 南薩 | 0.3 | 多 | (0.06) | 中：出水2 少：枕崎1, 伊集院1, 出水1, 牧園1, 湧水1, | | |
| | | 多 | 北薩 | 592 | 40 | 5 | | | 10 | 30 | 60 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 虫数 | 北薩 | 1.9 | 多 | | (0.2) | |
| | | やや少 | 大隅 | 0 | 0 | 6 | | | | | 100 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 虫数 | 大隅 | 0.0 | 並 | | (0.00) | |
| | | 多 | 県計 | 1,170 | 15 | 4 | | | 2 | 13 | 85 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 14 | 県平均 | 0.7 | 多 | (0.1) | | | |
| ○チャハマキ | 並 | 並 | 南薩 | 289 | 6 | 11 | | | 6 | 94 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | 12 | 0 | 24 | 25 | 1㎡当り | 南薩 | 0.1 | 多 | (0.02) | 少：枕崎1, 錦江1 | | |
| | | 並 | 北薩 | 0 | 0 | 3 | | | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 虫数 | 北薩 | 0.0 | | 並 | (0.01) |
| | | 多 | 大隅 | 243 | 13 | 3 | | | | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 虫数 | 大隅 | 0.1 | 多 | | (0) | |
| | | 並 | 県計 | 531 | 7 | 7 | | | 7 | 93 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 15 | 17 | 県平均 | 0.1 | 多 | (0.02) | | | | |
| ○チャノソノガ | 多 | 多 | 南薩 | 1,444 | 31 | 10 | | | 31 | 69 | 13 | 6 | 0 | 38 | 6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1㎡当り | 南薩 | 1.6 | 多 | (0.4) | 中：牧園1, 湧水1 少：知覧(後岳)1, 枕崎2, 伊集院2, 出水2, 溝辺1, 有明(野井倉)1, 有明(原田)2 | | |
| | | 並 | 北薩 | 740 | 50 | 40 | | | 20 | 30 | 50 | 10 | 30 | 60 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 | 70 | 80 | 巻葉数 | 北薩 | 10.3 | 多 | | (1.3) | |
| | | 多 | 大隅 | 485 | 25 | 13 | | | | 25 | 75 | 0 | 13 | 25 | 0 | 13 | 13 | 13 | 25 | 13 | 13 | 虫数 | 大隅 | 0.6 | やや多 | | (0.3) | |
| | | 多 | 県計 | 2,669 | 33 | 16 | | | 4 | 30 | 67 | 9 | 12 | 17 | 27 | 12 | 20 | 13 | 15 | 19 | 18 | 県平均 | 3.9 | 多 | (0.6) | | | |
| ○チャノミドリ ヒメヨコバイ | 多 | やや多 | 南薩 | 3,755 | 81 | 66 | | 6 | 13 | 63 | 19 | 44 | 56 | 75 | 69 | 75 | 82 | 65 | 65 | 41 | 88 | 4ヶ所叩き | 南薩 | 4.9 | 多 | (2.2) | 多：川辺1 中：知覧(後岳)1, 伊集院1, さつま1 少：穎娃(谷場)2・穎娃(青戸)1, 知覧(菊永)1, 知覧(後岳)1, 加世田2, 枕崎2, 伊集院1, さつま1, 出水1, 溝辺1, 牧園1, 湧水1, 末吉2, 有明(野井倉)1, 有明(原田)2, 鹿屋1, 錦江2 | |
| | | やや多 | 北薩 | 1,184 | 80 | 70 | | | 10 | 70 | 20 | 40 | 70 | 60 | 60 | 70 | 90 | 60 | 80 | 100 | 70 | 落とし虫数 | 北薩 | 4.8 | 多 | (1.5) | | |
| | | やや多 | 大隅 | 1,456 | 75 | 61 | | | | 75 | 25 | 38 | 63 | 88 | 38 | 88 | 50 | 75 | 38 | 63 | 75 | 虫数 | 大隅 | 1.6 | やや少 | (2.6) | | |
| | | やや多 | 県計 | 6,394 | 80 | 65 | | 4 | 9 | 67 | 20 | 41 | 60 | 75 | 59 | 77 | 76 | 66 | 61 | 57 | 81 | 県平均 | 4.1 | 多 | (2.1) | | | |
| ○チャノキイロ アザミウマ | 並 | 並 | 南薩 | 2,888 | 63 | 71 | | | 63 | 38 | 69 | 94 | 88 | 88 | 56 | 88 | 41 | 35 | 100 | 50 | 4ヶ所叩き | 南薩 | 4.5 | 少 | (18.8) | 少：穎娃(谷場)2, 川辺1, 加世田2, 枕崎1, 伊集院1, さつま1, 出水2, 溝辺1, 牧園1, 湧水1, 末吉2, 有明(野井倉)1, 有明(原田)2, 鹿屋2, 錦江2 | | |
| | | 並 | 北薩 | 1,184 | 80 | 72 | | | | 80 | 20 | 30 | 100 | 100 | 70 | 60 | 60 | 80 | 50 | 80 | 90 | 落とし虫数 | 北薩 | 4.6 | やや少 | | (14.1) | |
| | | やや多 | 大隅 | 1,698 | 88 | 63 | | | | 88 | 13 | 38 | 75 | 75 | 38 | 75 | 38 | 75 | 50 | 88 | 75 | 虫数 | 大隅 | 3.8 | やや少 | | (7.0) | |
| | | 並 | 県計 | 5,771 | 72 | 69 | | | | 72 | 28 | 54 | 90 | 87 | 72 | 62 | 71 | 56 | 42 | 93 | 63 | 県平均 | 4.4 | 少 | (14.5) | | | |
| カンザワハダニ | 並 | 並 | 南薩 | 578 | 13 | 15 | | | 13 | 88 | 0 | 6 | 0 | 19 | 31 | 65 | 0 | 12 | 6 | 13 | 寄生葉率 | 南薩 | 0.1 | やや少 | (0.5) | 少：穎娃(谷場)1, 知覧(後岳)2, さつま1, 湧水1, 有明(野井倉)2 | | |
| | | 並 | 北薩 | 296 | 20 | 29 | | | | 20 | 80 | 0 | 40 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 虫数 | 北薩 | 0.5 | やや少 | | (1.9) | |
| | | 多 | 大隅 | 485 | 25 | 8 | | | | 25 | 75 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 虫数 | 大隅 | 1.1 | 並 | | (0.9) | |
| | | 並 | 県計 | 1,359 | 17 | 16 | | | | 17 | 83 | 0 | 14 | 16 | 16 | 26 | 43 | 7 | 13 | 7 | 16 | 県平均 | 0.5 | やや少 | (1.0) | | | |
| ○クワシロ カイガラムシ | やや少 | 並 | 南薩 | 578 | 13 | 14 | | | 3 | 9 | 88 | 10 | 15 | 21 | 29 | 8 | 35 | 8 | 4 | 4 | 3 | 寄生株率 | 南薩 | 2.2 | 少 | (13.7) | 少：穎娃(青戸)1, 知覧(菊永)1, 枕崎1, 錦江4 ※クワシロカイガラムシは1地域4ほ場調査 | |
| | | 少 | 北薩 | 0 | 0 | 35 | | | | | 100 | 30 | 50 | 30 | 30 | 27 | 47 | 47 | 47 | 23 | 20 | 虫数 | 北薩 | 0.0 | 少 | (20.2) | | |
| | | 並 | 大隅 | 485 | 25 | 26 | | | 6 | 19 | 75 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 38 | 29 | 25 | 31 | 虫数 | 大隅 | 6.3 | やや少 | (20.2) | | |
| | | やや少 | 県計 | 1,063 | 13 | 21 | | | 3 | 10 | 87 | 12 | 25 | 25 | 29 | 17 | 33 | 22 | 18 | 13 | 13 | 県平均 | 2.5 | 少 | (17.2) | | | |
| ツマグロアオ カスミカメ | 並 | 多 | 南薩 | 866 | 19 | 10 | | | 19 | 81 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 24 | 12 | 0 | 13 | 1㎡当り | 南薩 | 0.8 | 多 | (0.2) | 少：知覧(菊永)1, 枕崎1, 伊集院1 | | |
| | | やや少 | 北薩 | 0 | 0 | 11 | | | | | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 30 | 被害芽数 | 北薩 | 0.0 | 並 | | (0.5) | |
| | | やや少 | 大隅 | 0 | 0 | 10 | | | | | 100 | 13 | 0 | 25 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 25 | 0 | 虫数 | 大隅 | 0.0 | やや少 | | (0.0) | |
| | | 並 | 県計 | 866 | 11 | 10 | | | | 11 | 89 | 10 | 4 | 13 | 4 | 8 | 10 | 18 | 7 | 13 | 13 | 県平均 | 0.4 | 並 | (0.2) | | | |
| チャトゲコナジラ ミ | - | - | 南薩 | 0 | 0 | - | | | | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 50 | 寄生葉率 | 南薩 | 0.0 | - | - | 中：さつま1, 末吉1 少：溝辺2, 牧園1, 湧水1, 末吉1, 有明(野井倉)1, 錦江2 | |
| | | - | 北薩 | 1,036 | 70 | - | | | 20 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 虫数 | 北薩 | 11.4 | - | | - |
| | | - | 大隅 | 728 | 38 | - | | | | 38 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 25 | 虫数 | 大隅 | 4.5 | - | | - |
| | | - | 県計 | 1,764 | 22 | - | | | 4 | 18 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 46 | 県平均 | 4.4 | - | - | | |

※その他特記事項

茶樹 病虫害発生予察巡回調査月報

2025年（令和7年）6/12～25 日調査

| 病虫害名 | 総合概評 | 概評 | 地域 | 発生面積 (ha) | 発生ほ場率 (%) | | 発生程度 (%) | | | | | 年次別 発生ほ場率 (%) | | | | | | | 発病・発生数 (%、頭、枚) | | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|----|----|-----------|-----------|----|----------|---|---|---|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|----------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 本年 | 平年 | 甚 | 多 | 中 | 少 | 無 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | | 本年 | 評価 | 平年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南薩：薩摩中南部 4,576ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8地点16ほ場 | | | 【南九州市颯娃町牧之内(谷場)②・颯娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北薩：川内川中流域・霧島山麓 1,477ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6地点 10ほ場 | | | 【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(論地)②、霧島市牧園町三体堂①、湧水町木場①、曾於市末吉町岩崎②】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大隅：大隅中南部 1,920ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4地点 8ほ場 | | | 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町城元②】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県計(熊毛・大島除く) 7,973ha (R5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18地点34ほ場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。