

作物名	病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生は場率 (%)			発生程度 (%)					年次別 発生は場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)					備 考	
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	前年	評価		平年
サトウキビ	黒穂病	多	多	奄美	641	8	2	0.8				8	92	0	0	0	0	0	2	0	0	4	2	100株当り 発病株率	奄美	0.08	0.02	多	(0.01)	喜界島：少3 沖永良部島：少1
		並	並	熊毛	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100株当り 発病株率	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)	
サトウキビ	葉焼病	並	並	奄美	1,763	22	34	20				22	78	20	22	16	16	10	19	8	14	38	34	5茎当り 病斑面積	奄美	1.1	0.4	やや多	(0.6)	奄美大島：少6 徳之島：少4 沖永良部島：少1
		並	並	熊毛	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5茎当り 病斑面積	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)	
サトウキビ	メイチュウ類	やや多	やや多	奄美	5,770	72	68	63				72	28	80	63	80	56	52	32	64	63	72	68	20株当り 被害茎率	奄美	1.5	1.6	並	(1.3)	奄美大島25ほ場のみ調査
サトウキビ	バッタ類	多	多	奄美	3,686	46	44	26			2	44	54	10	22	22	52	28	11	16	14	40	44	20株当り 食害面積	奄美	1.6	1.1	やや多	(0.8)	奄美大島：少10 徳之島：中1, 少4 沖永良部島：少2 与論島：少5
		並	並	熊毛	0	0	0	2					100	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20株当り 食害面積	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)	

※その他特記事項

【サトウキビ】

奄美：R7.7.7～18調査

熊毛：R7.7.18調査

●調査地点

サトウキビ 8,014ha (夏植え:821ha, 春植え:1,111ha, 株出し:5,254ha, 新植夏植え:828ha) 50は場調査【奄美大島30, 喜界島5, 徳之島5, 沖永良部5, 与論島5】 但し, メイチユウ類については奄美大島の25は場のみ

※ 栽培面積 サトウキビ：「令和5年産さとうきび及び甘しゅ糖生産実績」（令和6年9月 県農産園芸課）から出典

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。