

作物名	作型	栽培面積 ha		病虫害名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)										調査ほ場数	記 事		
								本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
サトイモ	早掘・普通	249	精査	○ 疫病	並	やや少	50	20	42		10		10	80	-	-	-	90	67	43	29	43	14	40	計 10	串良:多1少1		
				○ ハスモンヨトウ	多	多	249	100	49			50	50		50	42	50	30	33	71	50	29	71	60			南九州市 2	南九州:中1少1, 宮之城:中3少1, 串良:中1少3
				アブラムシ類	-	-	75	30	-		20		10	70	-	-	-	-	-	-	-	36	40	さつま町宮之城 4				
			達観	モザイク病		並	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	鹿屋市串良 4	串良:少2	
				セスジスズメ類		やや多	50	20	11	20			80	8	75	20	0	0	7	36	7	14	0					
				その他																					主な品種：大和, 大吉, 石川早生丸 生育時期：茎葉伸展期			

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値（平年値）から統計的に評価したものである。

注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して、評価したものである。

注3)「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。

注4)○：予報に掲載。