

キク病害虫発生予察巡回調査月報（7月）

調査期間： 県本土 2025/7/22

《施設栽培》 栽培面積（県本土） 114ha

| 病害虫名        | 地域  | 総合概評 | 概評  | 発生面積 (ha) | 発生ほ場率(%) |    | 発生程度別ほ場率 (%) |   |    |    |     | 発生ほ場率 (%) |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 調査地点数及び調査ほ場数 | 記 事                   |
|-------------|-----|------|-----|-----------|----------|----|--------------|---|----|----|-----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|-----------------------|
|             |     |      |     |           | 本年       | 平年 | 甚            | 多 | 中  | 少  | 無   | 15        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |              |                       |
| 白さび病        | 県本土 | 多    | 多   | 45        | 40       | 7  |              |   | 20 | 20 | 60  | 23        | 14 | 0  | 5  | 5  | 10 | 0  | 10 | 0  | 0  | 枕 崎 5        | 曾於：中2, 少2             |
| 黒斑病・褐斑病     |     | やや少  | やや少 | 0         | 0        | 2  |              |   |    |    | 100 | 5         | 10 | 0  | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 曾 於 5        |                       |
| ○ ハダニ類      |     | 少    | 少   | 34        | 30       | 44 |              |   |    | 30 | 70  | 36        | 52 | 55 | 43 | 52 | 40 | 20 | 50 | 50 | 40 | 合 計 10       | 曾於：少3（主要種：ナミハダニ）      |
| ○ アザミウマ類    |     | やや少  | やや少 | 34        | 30       | 40 |              |   |    | 30 | 70  | 36        | 29 | 45 | 33 | 43 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 内調査協力員       | 曾於：少3（主要種：ミカンキロアザミウマ） |
| カスミカメムシ類    |     | 並    | 並   | 0         | 0        | 0  |              |   |    |    | 100 | 0         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |              |                       |
| アブラムシ類      |     | 多    | 多   | 45        | 40       | 10 |              |   |    | 40 | 60  | 0         | 0  | 0  | 19 | 19 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0  | 枕 崎 5        | 曾於：少4                 |
| ハモグリバエ類     |     | やや少  | やや少 | 0         | 0        | 7  |              |   |    |    | 100 | 14        | 5  | 10 | 19 | 10 | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 曾 於 5        |                       |
| ハスモンヨトウ     |     | やや多  | 多   | 11        | 10       | 1  |              |   |    | 10 | 90  | -         | 0  | 5  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |              | 曾於：少1                 |
| オオタバコガ      |     | 並    | 並   | 0         | 0        | 0  |              |   |    |    | 100 | -         | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 生育期          |                       |
| シロイチモジヨトウ   |     | 並    | 並   | 0         | 0        | 1  |              |   |    |    | 100 | -         | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 節間伸長～開花      |                       |
| チョウ目害虫（被害葉） |     | やや多  | やや多 | 23        | 20       | 9  |              |   |    | 20 | 80  | 14        | 14 | 20 | 24 | 10 | 0  | 0  | 0  | 0  | 10 |              | 曾於：少2                 |

作付面積 県全体： 180ha

令和5年花き生産出荷実績より

露地栽培 63ha（県本土： 11ha）

（熊 毛： 0ha）

（奄美地域： 52ha）

施設栽培 116ha（県本土： 114ha）

（熊 毛： 1ha）

（奄美地域： 2ha）

※その他

曾於：立枯病が一部発生（夏ギクで発生がみられる）

※ 「概評」は、本年の発生ほ場率を、過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

※ 「総合概評」は、「概評」に発生程度を加味したものである。