

果樹 病害虫発生予察巡回調査月報

【カンキツ】

令和7年7月9日～18日調査

掲載	病害虫名	総合概評	概評	品種・地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)								発病・発生数 (%)			備考 発生確認地点 (下線は多・甚)			
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	本年		評価	平年	
そうか病 春葉	やや多	多	温州	284	38	11				38	63	0	0	13	0	0	10	40	10	30	10	温州	0.6	やや多	(0.2)	少：加世田1, 吹上1, 霧島1	
		並	甘夏	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)		
		並	その他中晩柑	0	0	2				100	0	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(0.1)		
		多	本土・熊毛	284	13	5				13	87	0	2	14	0	0	3	15	4	11	3	本土・熊毛	0.2	並	(0.1)		
そうか病 果実	並	並	温州	284	38	29				38	63	38	0	50	25	13	30	70	30	10	20	温州	1.0	並	(0.9)	少：加世田1, 吹上1, 霧島1	
		並	甘夏	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並	(0.0)		
		並	その他中晩柑	0	0	1				100	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並	(0.0)		
		やや多	本土・熊毛	284	13	9				13	87	7	0	11	8	3	10	26	12	4	7	本土・熊毛	0.3	並	(0.2)		
○かいよう病 春葉	多	多	温州	567	75	32				75	25	13	50	38	38	50	20	20	10	40	40	温州	1.6	やや多	(0.8)	少：いちき串2, 加世田1, 吹上1, 霧島2 中：高尾野1, 少：阿久根4, 出水4, 高尾野1	
		やや多	甘夏	329	100	87			10	90		100	100	100	75	88	80	80	90	70	90	甘夏	7.5	並	(6.8)		
		やや少	その他中晩柑	91	8	18				8	92	34	44	34	17	17	6	19	13	0	0	その他中晩柑	0.1	やや少	(1.1)		
		多	本土・熊毛	987	45	32			2	44	55	36	50	41	33	38	18	27	22	24	27	本土・熊毛	3.0	多	(2.2)		
○かいよう病 果実	多	多	温州	378	50	16				50	50	13	13	25	38	13	10	30	0	20	0	温州	1.1	多	(0.2)	少：いちき串2, 加世田1, 吹上1, 霧島2 多：高尾野1, 中：高尾野1, 少：阿久根4, 出水4 少：南さつま市(夕)1	
		多	甘夏	296	90	60		10	10	70	10	50	100	75	63	75	30	40	40	70	60	甘夏	12.0	やや多	(4.7)		
		やや少	その他中晩柑	91	8	17				8	92	22	44	16	29	4	0	38	6	0	8	その他中晩柑	0.1	やや少	(0.5)		
		やや多	本土・熊毛	765	35	23		2	2	32	65	23	43	23	38	20	6	35	9	17	13	本土・熊毛	4.3	多	(1.0)		
○黒点病	並	やや少	温州	95	13	33				13	88	50	63	100	38	25	0	20	10	10	10	温州	1.3	やや少	(9.7)	少：出水1 少：屋久島(ホ)4, 屋久島(夕)4	
		やや少	甘夏	0	0	18				100	25	75	25	50	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	やや少	(0.4)		
		多	その他中晩柑	728	67	23				67	33	25	31	34	13	17	6	56	31	13	0	その他中晩柑	1.6	並	(2.0)		
		やや多	本土・熊毛	823	38	23				38	62	30	41	45	25	15	4	38	20	10	3	本土・熊毛	1.0	やや少	(3.1)		
赤衣病	-	-	温州	0	0	2				100							0	0	0	0	10	※発生の有無のみ	-	-	-	少：屋久島(夕)3	
		-	甘夏	0	0	0				100								0	0	0	0		0	-	-		-
		-	その他中晩柑	273	25	40				25	75							25	50	50	44		33	-	-		-
		-	本土・熊毛	273	13	22				13	87							15	28	26	22		20	-	-		-

果樹 病害虫発生予察巡回調査月報

【カンキツ】

令和7年7月9日～18日調査

掲載	病害虫名	総合概評	概評	品種・地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)			備考 発生確認地点 (下線は多・甚)	
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	本年	評価	平年		
						〇ミカンハダニ	やや少	温州	189	25	36			13	13	75	38	50	75	38	25	0	40	40	30		20
やや少	甘夏	0	0	40					100	50	75	50	38	13	10	60	60	20	20	甘夏	0.0	並					
やや少	その他中晩柑	0	0	14					100	9	13	28	33	21	0	19	6	6	8	その他中晩柑	0.0	やや少	(1.9)				
やや少	本土・熊毛	189	9	22			4	4	91	18	25	39	35	20	1	31	25	17	14	本土・熊毛	2.4	やや少	(5.0)				
サビダニ類	並	並	温州	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	温州	0.0	並	(0.0)			
		並	甘夏	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並		(0.0)	
		並	その他中晩柑	0	0	1					100	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並		(0.0)	
		並	本土・熊毛	0	0	0					100	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	本土・熊毛	0.0	並		(0.0)	
カイガラムシ類	やや多	多	温州	95	13	2			13	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	温州	0.1	多	(0.0)	少：加世田1 (アカマルカイガラムシ)		
		並	甘夏	0	0	4					100	0	0	25	13	0	0	0	0	0	0	甘夏	0.0	並		(0.0)	
		並	その他中晩柑	0	0	2					100	0	0	3	0	4	0	0	0	13	0	その他中晩柑	0.0	やや少		(0.2)	
		やや多	本土・熊毛	95	4	2			4	96	0	0	5	3	3	0	0	0	0	6	7	本土・熊毛	0.0	並		(0.1)	
チャノキイロアザミウマ	並	並	温州	95	13	8			13	88	0	0	38	13	0	0	0	20	10	0	温州	0.1	並	(0.2)	少：加世田1		
		やや少	甘夏	0	0	5					100	0	0	25	0	13	0	10	0	0	0	甘夏	0.0	やや少		(0.1)	
		並	その他中晩柑	0	0	2					100	0	3	3	0	0	0	13	0	0	0	その他中晩柑	0.0	並		(0.4)	
		並	本土・熊毛	95	4	4			4	96	0	2	11	3	3	0	8	7	4	0	本土・熊毛	0.0	やや少	(0.3)			
アブラムシ類	少	やや少	温州	0	0	18				100	13	0	100	25	13	0	20	10	0	0	温州	0.0	並	(2.6)			
		並	甘夏	0	0	1					100	0	0		0	0	0	0	10	0	0	甘夏	0.0	並		(0.0)	
		少	その他中晩柑	0	0	31					100	25	19	47	21	13	38	63	0	25	58	その他中晩柑	0.0	やや少		(1.2)	
		少	本土・熊毛	0	0	22					100	20	14	51	18	10	22	41	5	13	30	本土・熊毛	0.0	やや少		(1.3)	
ミカンハモグリガ	並	少	温州	378	50	81			13	38	50	63	63	100	88	75	90	100	90	70	70	温州	3.8	-	-	中：いちき1, 少：いちき1, 加世田1, 出水1 甚：出水2, 中：阿久根2, 出水1, 高尾野1, 少：阿久根1, 出水1, 高尾野1	
		多	甘夏	296	90	52	20		40	30	10	25	50		63	63	40	80	80	30	40	甘夏	25.7	-	-		
		並	その他中晩柑	728	67	68					67	33	75	81	88	88	75	25	69	75	63	42	その他中晩柑	2.7	-		-
		並	本土・熊毛	1,402	64	71	3		10	51	36	68	75	90	83	73	47	80	81	61	51	本土・熊毛	10.6	-	-		
ゴマダラカミキリ	やや多	多	温州	189	25	3			25	75	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	温州	0.3	多	(0.0)	少：出水1, 霧島1		
		やや少	甘夏	0	0	5					100	25	0	0	0	0	0	0	0	10	10	甘夏	0.0	並		(0.1)	
		並	その他中晩柑	364	33	28					33	67	25	16	38	50	25	13	63	13	44	0	その他中晩柑	0.4		並	(0.6)
		やや多	本土・熊毛	553	25	19			25	75	20	11	27	30	15	10	38	6	27	1	本土・熊毛	0.2	やや少	(0.4)			

その他

●面積  
 県本土熊毛 2,177ha  
 温州 756ha  
 甘夏 329ha  
 その他中晩柑 1,092ha  
 ※果樹生産統計資料(R4年度産実績)より

●調査ほ場数  
 温州8(南薩2,北薩2,日置2,始良2)  
 甘夏10(北薩10)  
 その他中晩柑12(本かん4(熊毛4)かん8(南薩4,熊毛4))

●その他病害虫  
 出水地域の温州でチュウゴクアミガサハゴロモの寄生を確認(農政普及課出水市駐在)

●平年値：2015～2024年の平均値  
 ●ミカンハモグリガは、2022年まで発生の有無のみ調査