

作物名	病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)			発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)								発病・発生数 (%, 頭, 枚)						備 考			
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	前年		評価	平年	
カンキツ	そうか病（春葉）	並	並	奄美	0	0	0	3					100	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	100葉当り 発病葉率	奄美	0.0	0.0	並	(0.02)	
カンキツ	そうか病（果実）	やや少	やや少	奄美	0	0	14	7					100	0	0	29	0	14	0	14	0	0	0	14	100果当り 発病果率	奄美	0.0	0.3	やや少	(0.1)	
カンキツ	かいよう病（春葉）	並	並	奄美	0	0	0	4					100	29	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	100葉当り 発病葉率	奄美	0.0	0.0	並	(0.1)	
カンキツ	かいよう病（果実）	やや少	やや少	奄美	0	0	0	4					100	0	14	0	0	0	0	14	0	14	0	0	100果当り 発病果率	奄美	0.0	0.0	やや少	(0.1)	
カンキツ	黒点病	並	並	奄美	0	0	14	1					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100葉当り 発病葉率	奄美	0.0	0.1	並	(0.01)	
カンキツ	ミカンハダニ	多	多	奄美	127	29	0	3				29	71	0	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	100葉当り 寄生葉率	奄美	1.7	0.0	多	(0.02)	瀬戸内町：少 2
カンキツ	サビダニ類	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100果当り 被害果率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	カイガラムシ類	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100果当り 寄生果率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	チャノキイロ アザミウマ	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100果当り 被害果率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	アブラムシ類	多	多	奄美	190	43	14	7			14	29	57	0	0	0	0	0	0	29	14	14	14	100新梢当り 寄生新梢率	奄美	1.9	0.4	多	(0.2)	奄美市住用：少 1 瀬戸内町：中 1, 少 1	
カンキツ	ミカンハモグリガ	並	並	奄美	190	43	57	30				43	57	14	29	86	0	0	0	43	29	43	57	100葉当り 寄生葉率	奄美	1.3	0.6	やや多	(0.7)	奄美市住用：少 1 瀬戸内町：少 2	
カンキツ	ゴマダラカミキリ	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10樹当り 脱出孔率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	赤衣病	－	－	奄美	127	29	－	－				29	71											29	10樹当り 発病有無	奄美					奄美市住用 1, 瀬戸内町 1
【カンキツ】																															
カンキツ 443.3ha 【●その他中晩柑：441.2ha（タンカン380.6ha、津之輝29.0ha、ボンカン24.1ha、その他7.5ha），○温州みかん:2.0ha，○なつみかん:0.1ha】／7ほ場調査【名瀬3，住用2，瀬戸内2】調査品目は全てタンカン																															