

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（9月下旬）

(No. 1) 調査年月日：2025年 9月9～19日

生育 ステージ	傾穂期～黄熟期
------------	---------

病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率(%)		発生程度別面積 (ha)					程度別発生面積率 (%)										記 事					
					本年	昨年	甚	多	中	少	無	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19		20	21	22	23	24
					いもち病 (穂いもち)	やや少	やや少	南 薩	375	30	28				375	875				30	70		80	30	60	10	0
北薩平坦	0	0	21							5,853					100	46	21	17	21	21	42	33	13	0	0	0	
北薩山間	991	25	42							991	2,973				25	75	55	32	32	23	18	55	77	86	10	30	
大 隅	711	33	38							711	1,422				33	67	17	17	50	17	33	83	83	17	33	33	
県 計	2,077	16	31							2,077	11,123				16	84	46	24	31	20	21	50	57	37	10	14	
紋枯病	やや多	並	南 薩	625	50	37			125	500	625			10	40	50	50	20	70	60	40	10	20	20	60	20	中:勝目1,隼人2
			北薩平坦	2,927	50	43			585	2,341	2,927			10	40	50	63	38	46	17	54	67	42	50	30	25	少:知覧2,勝目1,大里1,蒲生1,上  小川2,宮崎1,高江2,浦之名1,東干  拓1,平川1,時吉1,大角1,祇答院1,  前目1,野里2
			北薩山間	991	25	26				991	2,973				25	75	50	41	23	14	36	14	9	32	35	5	
			大 隅	711	33	35				711	1,422				33	67	33	0	67	33	50	67	33	67	0	0	
			県 計	5,254	40	36			710	4,543	7,947			5	34	60	53	30	46	23	47	46	29	45	29	14	
ごま葉枯病	多	多	南 薩	1,000	80	66			250	750	250			20	60	20	50	50	90	60	30	100	30	70	90	90	中:知覧1,勝目1,蒲生1,東干拓1,湧  水1,前目1,木崎1,山野1
			北薩平坦	4,390	75	61			585	3,804	1,463			10	65	25	58	58	67	63	38	71	63	83	55	60	少:知覧1,古殿2,勝目1,大里2,蒲生  1,三拾町2,隼人2,上小川2,高江2,浦  之名1,鶴川内1,東干拓1,出水1,湧水  1,平川2,時吉2,大角2,中津川2,祇答  院2,前目1,田中2,木崎1,山野1,恒吉  2,末吉2,野里2
			北薩山間	3,964	100	53			793	3,171				20	80		45	73	68	77	27	50	5	59	65	65	
			大 隅	2,133	100	62				2,133					100		33	67	83	67	100	83	17	83	33	50	
			県 計	11,487	87	60			1,628	9,859	1,713			12	75	13	49	63	72	67	46	70	34	75	57	63	
もみ枯細菌病	やや多	多	南 薩	625	50	0			625	625				50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	少:勝目1,大里2,伊集院2
			北薩平坦	0	0	0				5,853					100	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
			北薩山間	0	0	0				3,964					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	0				2,133					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			県 計	625	5	0			625	12,575				5	95	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
内穎褐変病	やや少	やや少	南 薩	250	20	40			250	1,000				20	80	20	70	80	20	0	50	60	40	60	0	少:伊集院2,隼人1,国分1,末吉1,  野里1	
			北薩平坦	585	10	23			585	5,268				10	90	8	8	29	8	33	46	38	21	30	5		
			北薩山間	0	0	28				3,964					100	5	18	59	23	5	50	73	5	40	0		
			大 隅	711	33	28				711	1,422				33	67	17	0	67	33	50	33	33	50	0	0	
			県 計	1,546	12	27			1,546	11,654				12	88	10	15	49	18	26	45	49	23	30	2		
稻こうじ病	並	並	南 薩	250	20	20			250	1,000				20	80	50	30	30	0	20	10	10	20	10	20	10	少:知覧1,勝目1,前目1,末吉2
			北薩平坦	0	0	7				5,853					100	21	4	4	8	13	8	8	0	0	0	0	
			北薩山間	198	5	12			198	3,766				5	95	14	18	9	14	36	9	5	0	15	0		
			大 隅	711	33	22			711	1,422				33	67	0	50	0	17	50	17	17	17	50	0		
			県 計	1,159	9	12			1,159	12,041				9	91	18	19	7	11	27	11	9	4	15	1		

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（9月下旬）

生育  
ステージ  
傾穂期 ~ 黄熟期

(No. 1) 調査年月日：2025年 9月9~19日

病害虫名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率(%)		発生程度別面積 (ha)					程度別発生面積率 (%)					記 事										
					本年	昨年	甚	多	中	少	無	甚	多	中	少	無											
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
ツマク・ロコハ・イ	やや多	やや多	南 薩	500	40	28				500	750			40	60	30	10	40	50	30	30	10	20	30	少: 勝目2, 市来1, 伊集院1, 蒲生2, 始良2, 隼人2, 国分1, 高江1, 浦之名1, 出水2, 湧水2, 田中1, 山野2, 末吉1, 野里2		
			北薩平坦	3,219	55	26				3,219	2,634			55	45	33	21	29	42	21	13	0	8	40		50	
			北薩山間	991	25	19				991	2,973			25	75	14	41	9	18	5	9	5	9	40		45	
			大 隅	1,067	50	45				1,067	1,067			50	50	33	33	50	67	17	33	33	100	0		83	
			県 計	5,777	44	28				5,777	7,423			44	56	28	28	28	41	17	17	10	25	31		52	52
ヒ・イロウカ	やや少	やや少	南 薩	1,000	80	60			125	875	250			10	70	20	80	90	90	40	70	70	40	30	40	50	中: 勝目1 少: 知覧2, 古殿2, 勝目1, 市来1, 伊集院1, 始良1, 隼人1, 高尾野1, 出水2 短翅蟥の確認: 知覧, 古殿, 勝目, 東干拓, 六月田
			北薩平坦	1,463	25	49				1,463	4,390				25	75	63	92	83	8	67	83	17	8	45	20	
			北薩山間	0	0	53				0	3,964					100	50	100	91	23	91	77	5	14	65	15	
			大 隅	0	0	58				0	2,133					100	67	100	100	0	67	83	17	67	67	17	
			県 計	2,463	19	53			125	2,338	#####			1	18	81	61	95	89	14	73	80	15	22	54	21	
コブノメイ	並	並	南 薩	375	30	22				375	875			30	70	20	10	30	0	10	0	30	0	40	80	少: 勝目2, 市来1, 蒲生1, 隼人2, 国分2, 宮崎1, 高江1, 浦之名1, 鶴川内2, 平川1, 時吉1, 大角1, 中津川1, 祁答院1, 田中1, 木崎1, 山野1	
			北薩平坦	2,927	50	31				2,927	2,927			50	50	13	13	8	0	29	33	29	29	70	85		
			北薩山間	1,387	35	22				1,387	2,577			35	65	23	14	0	0	18	27	23	14	55	45		
			大 隅	0	0	35				0	2,133					100	50	50	33	50	33	0	17	67	0		
			県 計	4,689	36	28				4,689	8,511			36	64	23	19	13	9	29	28	22	20	62	59		
イホカミシ	やや少	やや少	南 薩	0	0	0				1,250					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			北薩平坦	0	0	1				0	5,853					100	0	0	0	0	0	0	0	4	5		0
			北薩山間	0	0	0				0	3,964					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			大 隅	0	0	15				0	2,133					100	0	0	0	50	33	33	0	0	33		0
			県 計	0	0	3				0	13,200					100	0	0	0	9	7	6	0	2	8		0
カミシ類	並	並	南 薩	875	70	47			125	750	375			10	60	30	70	40	55	40	25	45	83	20	30	65	調査月日: 9月1~4日 (28カ所×4ほ場) 本田でのすくい取り調査 (20回振り) 平均捕獲虫数 本年 1.0頭 (昨年 1.1頭) カミシ類: 種別構成比38.1% イホカミシ: 捕獲ほ場率0.9% (昨年2.5%)
			北薩平坦	1,902	33	39			439	1,463	3,951			8	25	68	48	54	48	38	33	23	14	33	21	75	
			北薩山間	1,288	33	34			297	991	2,676			8	25	68	55	25	45	32	36	41	30	32	18	30	
			大 隅	1,067	50	70			356	711	1,067			17	33	50	83	83	75	67	67	33	42	67	83	100	
			県 計	5,132	39	44			1,217	3,915	8,068			9	30	61	58	50	53	42	36	32	30	38	32	65	

栽培面積: 南薩 1,250 ha 北薩平坦 5,853 ha 北薩山間 3,964 ha 大隅 2,133 ha 平年は2015~2024の平均値。

注1) 「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

南 薩: 南九州市知覧町 永里(2)・川辺町 古殿(2)・川辺町 勝目(2), 日置市伊集院町 大田(2), いちき串木野市 大里(2)・・・調査ほ場数: 10

北薩平坦: 蒲生町 楠田(2), 始良市 三拾町(2), 隼人町 住吉(2), 霧島市国分 上小川(2), 薩摩川内市 宮崎(2)・高江(2)・入来浦之名(2)

阿久根市 鶴川内(2), 高尾野町 東干拓(2)・六月田(2)・・・調査ほ場数: 20

北薩山間: さつま町 宮之城平川(2)・時吉(2)・鶴田町大角(2)・中津川(2), 薩摩川内市 祁答院町上手(2)

伊佐市菱刈 前目(2)・田中(2), 伊佐市大口木崎(2)・山野(2), 湧水町 北方(2)・・・調査ほ場数: 20

大 隅: 曾於市末吉町(2)・大隅町 笠木(2), 鹿屋市野里(2)・・・調査ほ場数: 6

県 計 巡回調査地点数: 28地点, 調査ほ場数: 56