

作物名		作型	栽培面積 ha	病害虫名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)										調査ほ場数	調査年月日	令和7年 (2025年 9月9~19日)				
								本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		記	事				
根深ネギ	春まき	141	精 査	べと病	-	-	0	0	-					100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	計 12  伊佐(協力員) 4 日置,いちき串木野 4 鹿屋 4  伊佐:甚1多1中1, いちき串木野:少1, 鹿屋:中1 日置,いちき串木野 4 鹿屋 4  伊佐:甚1多1中1, いちき串木野:少1, 鹿屋:少3 伊佐:甚1, 日置:多1少2, 鹿屋:少1 日置:少1 伊佐:少1, いちき串木野:少1, 鹿屋:少1  主な品種:夏扇4号, 夏の宝山 生育時期:茎葉伸長期					
				さび病	-	-	0	0	-							100	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	0		
				黒斑病	-	-	47	33	-					17	17	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	58	
				アブラムシ類	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				ネギコガ	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				○ネギハモグリバエ	-	-	82	58	-	8	8	8	33	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	67
				○アザミウマ類	-	-	59	42	-	8	8		25	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				○ハスモンヨトウ	-	-	12	8	-				8	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	17
			○シロイチモジヨトウ	-	-	35	25	-				25	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	8	
			達 観	白絹病	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	17	
				軟腐病	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				疫病	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				その他																											
ダイコン	秋まき	1,126	精 査	軟腐病	-	-	0	0	-					100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	計 10  知覧 2 溝辺 2 鹿屋 2 大崎(協力員) 4  主な品種:夏みどり, 夏の守 生育時期:知覧:発芽~茎葉伸長期 溝辺, 鹿屋, 大崎:茎葉伸長期					
				アブラムシ類	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	0		
				ハイダラノメイガ	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				コナガ	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				○ハスモンヨトウ	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	8	8	
			達 観	ヨトウガ	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				モザイク病	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				萎黄病	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				べと病	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
				白さび病	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	0	
ダイコンサルハムシ	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0							
キスジノミハムシ	-	-	0	0	-								100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8							
その他																															

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して、評価したものである。

注3)「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。

注4)○:予報に掲載。

作物名		栽培面積 ha	病害虫名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)										調査ほ場数	記 事
作型		本年					平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
キャベツ	冬どり	733	軟腐病	並	並	0	0	2					100	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	計 12 溝辺:少1 山川 4 溝辺 4 串良 4 溝辺:中3 溝辺:多1中3, 串良:中1 主な品種: しずはま, 彩里, 夢ごろも 生育時期: 山川, 溝辺:本葉5~8枚 串良:本葉4~6枚	
			黒腐病	並	並	61	8	7				8	92	0	0	17	8	25	0	0	17	0	0		
			菌核病	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			コナガ	並	並	0	0	9					100	11	56	6	17	0	0	0	0	0	0		
			○ ハスモンヨトウ	並	並	183	25	26			25	75	0	39	56	33	25	8	8	17	25	25			
			○ シロイチモジヨトウ	並	並	0	0	3				100	-	-	17	0	0	0	0	0	8	0			
			オオタバコガ	並	並	0	0	1				100	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0			
			ヨトウガ	並	並	0	0	1				100	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0			
			モンシロチョウ	やや少	やや少	0	0	4				100	0	0	6	17	0	8	0	8	0	0			
			チョウ目害虫被害	やや少	やや少	305	42	68			8 33	58	-	-	-	-	58	83	33	58	92	83			
			アブラムシ類	並	並	0	0	0				100	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			達	モザイク病	並	並	0	0	0				100	6	0	0	0	0	0	0	0	0			
			観	べと病	並	並	0	0	5				100	0	0	0	17	25	0	0	0	0			
			観	タバコガ	並	並	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
観	その他																								

注1) 「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して、評価したものである。

注3) 「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。

注4) ○: 予報に掲載。