

作物名	病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)			発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)					備 考	
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24			本年	前年	評価		平年
カンキツ	かいよう病（春葉）	並	並	奄美	63	14	14	11				14	86	14	0	14	29	14	0	14	14	0	14	100葉当り 発病葉率	奄美	0.1	0.1	並	(0.1)	瀬戸内町：少 1
カンキツ	かいよう病（果実）	やや多	多	奄美	127	29	29	11				29	71	14	0	0	29	0	0	0	29	14	29	100果当り 発病果率	奄美	0.3	0.4	並	(0.2)	奄美市名瀬：少 2
カンキツ	黒点病	やや少	やや少	奄美	0	0	14	9					100	0	0	0	0	0	0	43	14	14	14	100葉当り 発病葉率	奄美	0.0	0.3	やや少	(0.3)	
カンキツ	ミカンハダニ	やや多	やや多	奄美	127	29	0	13				29	71	0	14	43	14	43	0	0	0	14	0	100葉当り 寄生葉率	奄美	1.4	0.0	多	(0.3)	奄美市名瀬：少 1 瀬戸内町：少 1
カンキツ	サビダニ類	並	並	奄美	0	0	0	3					100	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	100果当り 被害果率	奄美	0.0	0.0	並	(0.1)	
カンキツ	カイガラムシ類	多	多	奄美	127	29	14	9			14	14	71	0	0	0	0	0	0	14	43	14	14	100果当り 寄生果率	奄美	2.4	0.1	多	(0.2)	瀬戸内町：中 1， 少 1
カンキツ	チャノキイロ アザミウマ	並	並	奄美	0	0	0	1					100	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	100果当り 被害果率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	ミカンハモグリガ	多	やや多	奄美	380	86	71	63			57	29	14	0	14	100	100	29	57	86	86	86	71	100葉当り 寄生葉率	奄美	12.3	0.7	多	(1.4)	奄美市名瀬：中 1， 少 1 奄美市住用：中 1， 少 1 瀬戸内町：中 2
カンキツ	カメムシ類	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10樹当り 被害有無	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	果実吸蛾類	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10樹当り 被害有無	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	赤衣病	－	－	奄美	190	43	－	－				43	57										14	10樹当り 発病有無	奄美					奄美市住用 2， 瀬戸内町 1

※その他特記事項

【カンキツ】R7.9.17～22調査 カイガラムシ発生種：アカマルカイガラムシ
赤衣病の発生が散見される。

●調査地点

カンキツ 443.3ha 【●その他中晩柑 :441.2ha（タンカン380.6ha，津之輝29.0ha，ポンカン24.1ha，その他7.5ha），○温州みかん:2.0ha，○なつみかん:0.1ha】／7ほ場調査【名瀬3，住用2，瀬戸内2】調査品目は全てタンカン

※表中の「総合概評」は，「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。