

令和7年 10月 野菜病害虫発生予察巡回調査月報 ー露地 ー														調査年月日		令和7年 (2025年 10月10日～23日)											
作物名	作型	栽培面積 ha		病害虫名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)										調査ほ場数	記事	
								本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
ダイコン	秋まき	1,126	精査	軟腐病	－	－	225	20	－				20	80	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	計 10 知覧 2 溝辺 2 鹿屋 2 大崎(協力員) 4	溝辺:少1, 串良:少1	
				アブラムシ類	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0		知覧:少1	
				ハイマダラノメイガ	－	－	113	10	－				10	90	－	－	－	－	－	－	－	－	25	8		知覧:少1	
				コナガ	－	－	113	10	－				10	90	－	－	－	－	－	－	－	－	25	0		知覧:少1	
				○ハスモンヨトウ	－	－	788	70	－	20	20	10	20	30	－	－	－	－	－	－	－	－	38	31		知覧:少1, 溝辺:少1, 串良:中1, 大崎:甚2多2	
				ヨトウガ	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0			
			達観	モザイク病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0		0	
				萎黄病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0		0	
				べと病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0		0	
				白さび病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0		0	
				ダイコンサルハムシ	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0		8	
				キスジノミハムシ	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6		8	
				その他																							主な品種:夏みどり, 夏の守 生育時期:知覧, 溝辺, 鹿屋:根部肥大期～収穫期 大崎:茎葉伸長期
ハクサイ	早まき・普通	241	精査	軟腐病	－	－	121	50	－				50	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38	計 8 曾於市 4 霧島市(協力員) 4	霧島:少4	
				アブラムシ類	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0		霧島:中4	
				ヨトウガ	－	－	121	50	－			50		50	－	－	－	－	－	－	－	－	50	恒吉:少1, 霧島:中4			
			○ハスモンヨトウ	－	－	151	63	－			50	13	38	－	－	－	－	－	－	－	－	50					
				コナガ	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	50				
			達観	白斑病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0			
				べと病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0			
				黒斑病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0			
				モザイク病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0			
				ハイマダラノメイガ	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0			
			その他																							主な品種:ちよぶき70 生育時期:本葉6～8枚～収穫期	

注1) 「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2) 「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して、評価したものである。

注3) 「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。

注4) ○: 予報に掲載。

令和 7 年 10月 野菜病害虫発生予察巡回調査月報 ー露地 ー										調査年月日		令和 7 年 (2025年 10月10日～23日)														
作物名	作型	栽培面積 ha		病害虫名	総合 概評	概評	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)		発生ほ場率 (%)										調査 ほ場数	記 事			
								本年	平年	甚	多	中	少	無	15	16	17	18	19	20	21			22	23	24
キャベツ	冬どり	733	精査	軟腐病	並	並	0	0	1					100	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	計 12 山川 4 溝辺 4 串良 4 串良:中1 串良:少1 山川:少2, 溝辺:中4, 串良:甚1中1少2	山川:中1, 溝辺:少1, 串良:多1少1 串良:中1 串良:少1 山川:少2, 溝辺:中4, 串良:甚1中1少2
				黒腐病	やや少	やや少	0	0	4					100	6	11	8	17	0	0	0	0	0	0		
				菌核病	並	並	0	0	1					100	0	6	0	8	0	0	0	0	0	0		
				コナガ	やや少	やや少	0	0	18					100	33	17	83	17	8	8	8	0	0	0		
				○ ハスモンヨトウ	多	やや多	80	33	22		8	8	17	67	11	22	42	17	0	25	42	8	25	25		
				○ シロイチモジヨトウ	並	並	0	0	3					100	-	-	6	0	0	0	0	17	0	0		
				オオタバコガ	並	並	20	8	9			8		92	6	17	0	8	17	0	8	8	13	8		
				ヨトウガ	やや少	やや少	0	0	3					100	6	11	0	0	0	0	0	17	0	0		
				モンシロチョウ	並	やや多	20	8	5				8	92	0	6	8	17	0	0	0	8	0	8		
				チョウ目害虫被害	多	やや多	201	83	67	8		42	33	17	-	-	-	-	58	92	50	75	25	100		
				アブラムシ類	やや少	やや少	0	0	2					100	6	6	0	0	0	0	0	0	0	8		
			達観	モザイク病	並	並	0	0	1					100	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0		
				べと病	やや少	やや少	0	0	7					100	17	6	0	8	42	0	0	0	0	0		
				タバコガ	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				その他																						
エンドウ類	冬・春どり	479	精査	菌核病	並	並	0	0	0					100	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	計 8 山川 4 阿久根 - 垂水 4 山川:少1, 垂水:少3 山川:少1, 垂水:少3 垂水:少1 垂水:1 主な品種: スーパーグリーン, まめこぞう, スタッ・エンドウ 生育時期: 山川:本葉10枚, 阿久根:植付前 垂水:開花期	山川:少1, 垂水:少3 垂水:少1 垂水:1
				褐紋・褐斑病	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				さび病	並	並	0	0	0					100	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0		
				○ うどんこ病	並	並	0	0	1					100	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0		
				○ ハスモンヨトウ	やや多	やや多	240	50	23			50	50	0	0	25	40	0	13	10	33	38	75			
				○ シロイチモジヨトウ	やや多	多	240	50	16			50	50	0	0	25	60	13	0	0	0	25	38			
				オオタバコガ	並	並	0	0	1					100	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0		
				ヨトウガ	並	並	0	0	1					100	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0		
				○ ハモグリバエ類	並	並	60	13	17			13	88	17	0	33	0	63	0	20	0	0	38			
				○ アザミウマ類	並	並	0	0	1					100	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0		
			達観	立枯性病害	やや多	多	60	13	4			13	88	0	17	8	0	0	0	0	0	0	0	13		
				タバコガ類	並	並	0	0	1					100	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0		
				ウラナミシジミ	並	並	0	0	1					100	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0		
				その他																						

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値（平年値）から統計的に評価したものである。

注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して、評価したものである。

注3)「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。

注4)○: 予報に掲載。