

果樹 病害虫発生予察巡回調査月報

【カンキツ】

令和7年10月14日～21日調査

掲載	病害虫名	総合 概評	概評	品種・地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)				備考 発生確認地点（下線は多・甚）	
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	本年	評価	平年			
○ かいよう病 春葉	並	並	多	温州	378	50	15				50	50	0	13	38	25	0	20	0	10	20	20	温州	0.6	並	(0.9)	加世田:少1, 出水:少1, 霧島:少2 阿久根:少3, 出水:少3, 高尾野:少2 南さ(多):少2	
			並	甘夏	263	80	81				80	20	100	100	100	75	88	80	90	80	44	50	甘夏	1.8	やや少	(4.9)		
			やや少	その他中晩柑	182	17	35				17	83	53	56	50	29	13	19	25	38	33	33	その他中晩柑	1.7	並	(1.3)		
			並	本土・熊毛	823	38	36				38	62	48	52	52	38	25	26	25	34	30	31	本土・熊毛	1.4	並	(1.9)		
○ かいよう病 果実	多	多	多	温州	473	63	9				63	38	0	13	38	0	0	20	0	10	10	0	温州	0.9	並	(0.4)	市来:少2, 加世田:少1, 出水:少2 阿久根:少3, 出水:少3, 高尾野:少1, 中1 屋久(多):少3, 南さ(多):少3, 屋久(多):3	
			やや多	甘夏	263	80	68			10	70	20	100	75	50	63	63	80	60	70	78	40	甘夏	6.1	やや多	(4.2)		
			多	その他中晩柑	819	75	34				75	25	59	59	75	25	17	19	31	6	47	0	その他中晩柑	1.9	並	(1.9)		
			多	本土・熊毛	1,555	71	33			2	70	29	52	52	66	28	23	26	25	16	38	6	本土・熊毛	3.0	やや多	(2.1)		
○ 黒点病	多	多	並	温州	662	88	92			13	75	13	100	100	100	100	100	100	90	80	90	60	温州	7.5	やや少	(36.1)	市来:少2, 加世田:少1, 吹上:少1, 出水:中1, 少1, 霧島:少1 屋久(多):少4, 南さ(多):少4, 屋久(多):4	
			少	甘夏	0	0	47					100	100	75	50	63	13	40	60	10	44	20	甘夏	0.0	やや少	(3.9)		
			多	その他中晩柑	1,092	100	60				100		66	44	50	67	71	25	94	75	40	67	その他中晩柑	3.0	やや少	(8.1)		
			多	本土・熊毛	1,754	81	65			4	76	19	75	57	59	73	65	50	88	68	58	58	本土・熊毛	3.2	やや少	(13.1)		
赤衣病	一	一	一	温州	0	0	2					100						0	0	0	10	0	※発生の有無のみ	一	一	一		
			一	甘夏	0	0	0					100						0	0	0	0	0		一	一	一		
			一	その他中晩柑	0	0	12					100						6	6	13	33	0		一	一	一		
			一	本土・熊毛	0	0	7					100						4	3	6	21	0		一	一	一		
○ ミカンハダニ	やや多	やや多	並	温州	378	50	47			13	38	50	75	38	38	25	50	10	70	40	60	60	温州	9.9	並	(9.5)	市来:中1, 少1, 加世田:少1 出水:少1, 高尾野:少1 屋久(多):少1, 屋久(多):1	
			やや少	甘夏	66	20	34				20	80	25	25	50	13	38	10	70	20	33	60	甘夏	0.4	やや少	(3.6)		
			並	その他中晩柑	182	17	12				17	83	44	6	38	0	8	6	0	0	20	0	その他中晩柑	0.3	並	(0.9)		
			並	本土・熊毛	626	29	25			4	24	71	48	14	39	8	23	8	31	17	36	30	本土・熊毛	2.9	並	(3.4)		
カメムシ類	並	並	並	温州	0	0	8				100	0	0	38	0	38	0	0	0	0	0	※発生の有無のみ	一	一	一	屋久(多):少2		
			並	甘夏	0	0	2					100	0	0	0	0	13	10	0	0	0		0	一	一		一	
			多	その他中晩柑	182	17	5				17	83	0	6	9	4	8	0	0	0	27		0	一	一		一	
			並	本土・熊毛	182	8	5				8	92	0	5	14	3	15	1	0	0	14		0	一	一		一	
○ 果実吸蛾類	やや多	やや多	やや多	温州	662	88	64				88	13	63	75	63	25	25	80	60	80	70	100	※発生の有無のみ	一	一	一	市来:少2, 加世田:少1, 吹上:少1 出水:少2, 霧島:少1	
			並	甘夏	0	0	7					100	0	25	0	0	0	40	0	0	0	0		一	一	一		
			並	その他中晩柑	0	0	2					100	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0		一	一	一		
			やや多	本土・熊毛	662	30	20				30	70	18	23	11	5	5	29	19	28	25	35		一	一	一		

その他

●面積
県本土熊毛 2,177ha
温州 756ha
甘夏 329ha
その他中晩柑 1,092ha
※果樹生産統計資料(R4年度産実績)より

●調査ほ場数
温州8(南薩2,北薩2,日置2,
始良2)
甘夏10(北薩10)
ボカン4(熊毛4)
カンカン8(南薩4,熊毛4)

●その他病害虫
出水市の果樹園では温州,甘夏及
び防風垣のイヌマキでチュウゴクア
ミガサハゴロモの産卵枝が散見され
た

●平年値:2015～2024年の平均値