茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年(令和7年)10/16~10/23日調査

病害虫名 総合 概評	概評	地域		発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)								年次		発生ほ %)	場率						病•発生 %, 頭, 柊			備考	
	TANCE T			(ha)	本年	平年	甚	多	中 少	> 無	Ę,	15 '	16	' 17	' 18	' 19	'20	'21	' 22	' 23	' 24			本年	評価	平年	
炭疽病	*	並	南薩	2, 288	50	55			19	31	50	69	25	38	38	63	65	76	71	59	50	1 ㎡当り	南薩	16.8	多	(7.3)	
		やや少	北薩	1,034	70	80			10	60 3	30	60	80	80	80	80	90	80	100	80	70	病棄数	北薩	17. 1	多	(7.5)	→少:頴娃(谷場) 1 、川辺 2 、伊集院 2 、
	<u>並</u>	やや少	や少 大隅	720	38	43			;	38	3	50	50	38	38	38	50	50	50	38	25		大隅	0.9	並	(1.1)	
		やや少	県計	4, 042	51	57			13	38 4	19	62	41	45	45	60	65	71	71	58	48		県平均	13. 1	多	(5. 9)	,, ,
輪斑病ややり		やや少	南薩	286	6	18				6	94	13	19	6	6	13	18	41	0	24	44	1 ㎡当り	南薩	0.1	やや少	(0.8)	
	בוז ביציבים.	並	北薩	591	40	44			4	10	50	20	30	30	40	70	60	40	60	60	30	病棄数	北薩	0.6). 6 <u>並</u> (1.3) 少: 伊集院 1, 出水 1	少:伊集院1,出水1,溝辺1,牧園	
	14.69	やや多	大隅	480	25	16			:	25 7	'5	13	0	25	25	13	13	25	25	0	25		大隅	0.9	並	(2.1)	1, 湧水1, 有明(原田)2
		やや少 県計	1, 357	17	22				17 8	33	14	16	15	17	23	23	37	17	25	37		県平均	0.4	やや少	(1.2)		
		多	南薩	1, 144	25	10			:	25	75	6	13	19	0	6	24	24	6	0	6	発症梢数	南薩	1.0	並	(0.8)	ー少: 頴娃(谷場) 1,知覧(後缶) 2,伊集 院1,さつま1,出水1,溝辺1,牧園 1,湧水1,末吉2,有明(原田) 1,鹿屋 □1,
新梢枯死症	多	多	北薩	1,034	70	48				70 3	30	30	40	80	30	50	50	50	50	40	60		北薩	2.9	多	(1.5)	
材料行列は多しが正	37	並	大隅	480	25	20			:	25 7	'5	0	38	13	13	38	25	13	13	13	38		大隅	0.8	並	(0.6)	
		多	県計	2, 658	33	20			:	33 (57	9	24	28	9	22	28	26	16	10	24		県平均	1.5	やや多	(1.0)	
469.1 ± 4.		多	南薩	1, 144	25	8			:	25 7	'5	19	6	0	6	6	18	24	0	0	6	1 ㎡当り	南薩	0.6	並	(0.7)	少: 頴娃(谷場) 1,知覧(後岳) 1,川辺 1,加世日 1
	<u>並</u>	少	北薩	0	0	20				10	00	30	0	20	0	50	10	30	20	20	20	病葉数	北薩	0.0	やや少	(0.2)	
網もち病		並	大隅	0	0	1				10)0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0		大隅	0.0	やや少	(0.1)	
		やや多	県計	1, 144	14	9				14 8	36	16	4	4	4	13	15	19	4	4	7		県平均	0.3	並	(0.4)	

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2025年 (令和7年) 10/16~10/23日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生 面積		ま場率 %)		発生程度 (%)				年次別 発生ほ場率 (%)											発病・発生数 (%, 頭, 枚)				備 考
	PAPPI			(ha)	本年	平年	甚	多	中	_		15 '	16 '	17	18	' 19	'20	'21	' 22	' 23	'24			本年	評価	平年	
チャノコカク モンハマキ		やや少	南薩	0	0	6						3	0	0	6	6	0	6	0	18	13	1 ㎡当り	77770-	0.0	やや少	(0.1)	
	小	やや少	北薩	0	0	7					100 3	30	10	0	0	0	0	20	10	0	0	虫数	北薩	0.0	やや少	(0.3)	
		やや少	大隅	0	0	6					100	0	13	13	0	0	0	0	13	25	0		大隅	0.0	並	(0.0)	
		少	県計	0	0	6					100 1	3	5	3	4	4	0	7	5	16	7		県平均	0.0	やや少	(0.1)	
チャハマキ			南薩	0	0	10						25	6	13	6	6	18	12	0	0	13	1 ㎡当り		0.0	並	(0.1)	2 · [Am 1] [D3/11-1
	並	多	北薩	443	30	7		20		10	70 2	20	0	0	0	20	10	0	0	10	10	虫数	北薩	5. 9	多	(0.2)	
7 17 11	315	並	大隅	240	13	15				13		25	0	0	38	25	13	13	13	13	13		大隅	0.1	並	(0.1)	少:出水1,錦江1
		並	県計	683		11		4		5	91 2	24	4	7	13	13	15	10	3	5	12		県平均	1.8	多	(0.1)	
		やや少	南薩	286		10				6	94 1	9	6	13	6	6	6	12	12	12		1 ㎡当り	7.14.17	0.4	並	(0.8)	
チャノホソガ	並	やや少は	北薩	443	30	41				30	70 4	10			40	40	40	60	30	60	20	巻葉数	北薩	0.9	並	(0.6)	少:伊集院1,溝辺2,牧園1,湧水1,
7 (7 4.2)4		多	大隅	1, 200	63	25				63	38 3	38	0	25	0	13	63	25	25	63	0		大隅	1.6	多	(0.3)	有明(野井倉)2,鹿屋1,錦江2
		やや多	県計	1, 929	24	19				24	76 2	27	11	21	11	14	26	24	18	33	11		県平均	平均 0.8 並 (0.6)			
		並	南薩	1,716	38	38				38	63 3	38	63	31	31	38	29	24	53	41		4ヶ所叩き	7.14.17	0.6	やや少	(1.2)	少: 頴娃(谷場) 1,知覧(菊永) 1, ,川辺2,枕崎1,伊集院1,溝辺1,牧
チャノミドリ ヒメヨコバイ	並	やや少	北薩	591	40	52				40	60 6	60	60	40	20	50	80	40	50	70	50	落とし虫数	北薩	1.2	並	(1.1)	
		並	大隅	720		46				38					50	50	75	13	25	75	50		大隅	1.9	多		園 1 , 湧水 1 , 末吉 1 , 有明(野井倉)
		並	県計	3, 027	38	43				38		_		34	34	43	49	24	46	55	43		県平均	1.1	並	(1.1)	1, 錦江2
	やや少	並	南薩	1, 430	31	36				31	69 7	75			44	19	29	0	24	29		4ヶ所叩き		0.6	少	(7.5)	少: 頴娃(谷場) 1・頴娃(青戸) 1, 知覧
チャノキイロ		やや少	北薩	591		46				40					30	40	50	40	50	50	30	落とし虫数	1-11-	2.3		(5.5)	(菊永)1, ,川辺1, 枕崎1, さつま1, 出水1, 牧園1, 湧水1, 有明(野井倉)1, 鹿屋
アザミウマ		並	大隅	960	50	59				50	50 7	75	63	50	63	38	63	75	25	75	63		大隅	1.8	やや少	(2.8)	
		並	県計	2, 981	37	43				37	63 7	72	55	36		27	41	26	29	44	57		県平均	1.4	少	(5.8)	1, 錦江2
	並	やや少	南薩	858		33				19	81	0	19	38	25	25	29	53	47	53	38	寄生葉率		0.4	やや少	中:傅辺 1 , 木 百 1	中:溝辺1, 末吉1
○ カンザワハダニ		やや多	並大隅	1,034	70	42			20	50					10	60	40	60	90	30	30		北薩	6.3	11.44	少: 頴娃(青戸) 1, 川辺1, 加世田1,	
0,70,00				720	•	44				38			13	38	38	63	38	88	13	75	50		大隅	* 1 ±±	枕崎1, さつま1, 溝辺1, 牧園1, 湧 水1, 末吉1, 有明(野井倉)1, 鹿屋2		
		並	県計	2,612		37			4	29			_	_	25	41	33	63	47	54	39		県平均	2.4	多	(1.3)	小1,木台1,有奶(野开启)1,庭座2
		少		286		36				6	_					44	41	31	29	22		寄生株率		0.6	少	(32.9)	 中:鹿屋
クワシロ	少	少	北薩	0	Ů	43						33 37			80	57	53	67	17	15		北薩	0.0	少	(29.5)	T . 严重 少:加世田 1 , 伊集院 1 , 有明(原田)	
カイガラムシ		やや少	大隅	480	•	39			6	19	·······•					63	50	42	25	29	19		大隅	5.6	少	(21.3)	1, 鹿屋1,錦江2
ヨモギ エダシャク		少	県計	766		38			2	8						55	46	38	35	23	20	NAC TROUBLE	県平均	1.6	少	(29.0)	
		やや少	南薩	0	0	2						0	0	6	6	0	6	0	0	6		※発生の		-	-	-	
	やや少	やや少やや少	北陸大隅	0	0	5 10						20	0	0	0 25	0	20	13	0	0 25	10	有無のみ	大隅	_	_	_	-
		やや少	· 人俩 · 県計	0	•	10 5						.0	0		25 10	0	7	13 3	13 3	∠5 9	2		人 内 県平均		_ 	_ _	
		-	南薩	286	Ů	-			+	6	94 –	_	J –	4 -	10	-	_ '	<u>ა</u> –	ა _	24		寄生葉率		0. 1	_	_	
		_	北薩	591		_			20	20	60 -	-	_	_		-	_	_	_	50	60	可生米平	北薩	4. 7	_	_	中: 末吉2
チャトゲコナジラミ	-	_	大隅	480	25	_			20	25	75 -	_	_	_		_	_	_	_	25	25		大隅	1. 1	_	_	〒・ペロ2 少:伊集院 1 ,牧園 1 ,湧水 1 ,錦江2
		_	県計	1, 357	17		ļ		4		83 -		-	 -		-	_	_	_	29	39		県平均	1. 7	_	-	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
※その他特記事項	·		71711	1,001	11				1	10	50									20	00	l	211.1.19	1. 1			<u>l</u>

※その他特記事項

南薩:薩摩中南西部 4,576ha 8地点16ほ場 【南九州市頴娃町牧之内(谷場)②・頴娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】

「南さつま市加世田内山田(東山)②、林隆町上が10年7月20日 お見町温屋(オル)② が見町前(8 「南さつま市加世田内山田(東山)②、林崎市別府(中原)②、日置市伊集院町古城(飯幸礼)②】 【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(論地)②、霧島市牧園町三体堂①、 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町城元②】 北薩:川内川中流域・霧島山麓 1,477h 6地点 10ほ場 【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(論地)② 大隅:大隅中南部 1,920ha 4地点 8は場 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町県計(熊毛・大島除く) 7,973ha (R5) 18地点34ほ場 ※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。

※チュウゴクアミガサハゴロモ:さつま,出水,溝辺で確認