

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（9月下旬）

調査年月日：2026年 9月10～18日（斑点米がみ：9月1～8日）

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（9月下旬）																							生育 ステージ	傾穂期 ～ 黄熟期	
調査年月日：2026年 9月10～18日（斑点米が少：9月1～8日）																									
病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率(%)		程度別発生面積率(%)					年次別発生面積率(%)										記 事			
					本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
いもち病 (穂いもち)	やや少	やや少	南 薩	127	10	23				10	90	30	60	10	0	10	50	30	10	0	30	少：知覧1、湧水1、宮之城2、祁答院1、菱刈田中1、 大口木崎1、鹿屋1			
			北薩平坦	0	0	17					100	21	17	21	21	42	33	13	0	0	0				
			北薩山間	1,430	33	39				33	67	32	32	23	18	55	77	86	10	30	25				
			大 隅	393	17	40				17	83	17	50	17	33	83	83	17	33	33	33				
			県 計	1,950	14	28				14	86	24	31	20	21	50	57	37	10	14	16				
紋枯病	やや少	やや少	南 薩	381	30	37				30	70	20	70	60	40	10	20	20	60	20	50	少：知覧1、川辺勝目1、始良1、国分1、川内宮崎1、 阿久根1、湧水1、菱刈前目1、鹿屋2			
			北薩平坦	1,256	20	42				20	80	38	46	17	54	67	42	50	30	25	50				
			北薩山間	477	11	23				11	89	41	23	14	36	14	9	32	35	5	25				
			大 隅	787	33	35				33	67	0	67	33	50	67	33	67	0	0	33				
			県 計	2,900	20	35				20	80	30	46	23	47	46	29	45	29	14	40				
ごま葉枯病	並	並	南 薩	889	70	69				70	30	50	90	60	30	100	30	70	90	90	80	中：川内高江1、大隅1 少：川辺古殿1・勝目2、市来2、伊集院2、 蒲生1、始良1、国分1、川内宮崎2・高江1、 阿久根2、高尾野1、出水2、湧水2、中津川2、 祁答院2、菱刈前目1・田中1、大口木崎2・ 山野2、大隅1、末吉1、鹿屋1			
			北薩平坦	3,768	60	63			5	55	40	58	67	63	38	71	63	83	55	60	75				
			北薩山間	2,860	67	59				67	33	73	68	77	27	50	5	59	65	65	100				
			大 隅	1,573	67	68			17	50	33	67	83	67	100	83	17	83	33	50	100				
			県 計	9,090	64	64			5	59	36	63	72	67	46	70	34	75	57	63	87				
もみ枯細菌病	並	やや多	南 薩	0	0	5					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	少：菱刈前目1			
			北薩平坦	0	0	0					100	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0				
			北薩山間	238	6	0				6	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			県 計	238	2	1				2	98	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5				
内穎褐変病	やや少	やや少	南 薩	254	20	40				20	80	70	80	20	0	50	60	40	60	0	20	少：知覧1、川辺古殿1、隼人1、湧水1、 菱刈前目1・田中1			
			北薩平坦	314	5	23				5	95	8	29	8	33	46	38	21	30	5	10				
			北薩山間	715	17	27				17	83	18	59	23	5	50	73	5	40	0	0				
			大 隅	0	0	30					100	0	67	33	50	33	33	50	0	0	33				
			県 計	1,283	9	27				9	91	15	49	18	26	45	49	23	30	2	12				
稲こうじ病	やや少	やや少	南 薩	381	30	17			10	20	70	30	30	0	20	20	10	10	20	10	20	中：知覧1 少：知覧1、川辺古殿1、末吉1			
			北薩平坦	0	0	5					100	4	4	8	13	8	8	0	0	0	0				
			北薩山間	0	0	11					100	18	9	14	36	9	5	0	15	0	5				
			大 隅	393	17	25				17	83	50	0	17	50	17	17	17	50	0	33				
			県 計	774	5	11			1	5	95	19	7	11	27	11	9	4	15	1	9				

栽培面積：南薩 1,270 ha 北薩平坦 6,280 ha 北薩山間 4,290 ha 大隅 2,360 ha 平年は2016～2025の平均値

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

南 薩： 南九州市知覧町 永里(2)・川辺町 古殿(2)・川辺町 勝目(2)、日置市伊集院町 大田(2)、いちき串木野市 大里(2)・・・調査ほ場数：10

北薩平坦： 蒲生町 楠田(2)、始良市 三拾町(2)、隼人町 住吉(2)、霧島市国分 上小川(2)、薩摩川内市 宮崎(2)・高江(2)・入来浦之名(2)

阿久根市 鶴川内(2)、高尾野町 東干拓(2)・六月田(2)・・・調査ほ場数：20

北薩山間： さつま町 宮之城時吉(2)・鶴田町大角(2)・中津川(2)、薩摩川内市 祁答院町上手(2)

伊佐市菱刈 前目(2)・田中(2)、伊佐市大口木崎(2)・山野(2)、湧水町 北方(2)・・・調査ほ場数：18

大 隅： 曾於市末吉町(2)・大隅町 笠木(2)、鹿屋市野里(2)・・・調査ほ場数：6

県 計 巡回調査地点数：27地点、調査ほ場数：54ほ場

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（9月下旬）

調査年月日：2026年 9月10～18日（斑点米がみし：9月1～8日）

生育 ステージ	傾穗期 ～ 黄熟期
------------	-----------

病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)		程度別発生面積率 (%)					年次別発生面積率 (%)										記 事
					本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
ツマゲ・ロコバ・イ	並	並	南 薩	254	20	29				20	80	10	40	50	30	30	30	10	20	30	40	少：川辺勝目2、蒲生1、始良2、隼人1、国分1、 入来1、湧水1、宮之城2、祁答院1、菱刈前目2、 大口山野1、大隅1、末吉2、鹿屋1
			北薩平坦	1,570	25	28				25	75	21	29	42	21	13	0	8	40	50	55	
			北薩山間	1,668	39	21				39	61	41	9	18	5	9	5	9	40	45	25	
			大 隅	1,573	67	47				67	33	33	50	67	17	33	33	100	0	83	50	
			県 計	5,066	36	29				36	64	28	28	41	17	17	10	25	31	52	44	
トビ・イロウカ	やや少	やや少	南 薩	0	0	60					100	90	90	40	70	70	40	30	40	50	80	少：入来2、菱刈前目1・田中1
			北薩平坦	942	15	45				15	85	92	83	8	67	83	17	8	45	20	25	
			北薩山間	477	11	48				11	89	100	91	23	91	77	5	14	65	15	0	
			大 隅	0	0	52					100	100	100	0	67	83	17	67	67	17	0	
			県 計	1,419	10	48				10	90	95	89	14	73	80	15	22	54	21	19	
コブ・ノメイガ	多	多	南 薩	1,270	100	23		10	10	80		10	30	0	10	0	30	0	40	80	30	甚：国分1、阿久根2 多：川辺勝目1、出水2、鹿屋1 中：知覧1、国分1、高尾野2、宮之城1、鶴田1、 中津川1、菱刈田中1、大口木崎2、 末吉1、鹿屋1
			北薩平坦	6,280	100	35	15	10	15	60		13	8	0	29	33	29	29	70	85	50	
			北薩山間	3,813	89	23			28	61	11	14	0	0	18	27	23	14	55	45	35	
			大 隅	2,360	100	30		17	33	50		50	33	50	50	33	0	17	67	0	0	
			県 計	13,723	97	30	7	8	21	60	3	19	13	9	29	28	22	20	62	59	36	
イカリカミシ	やや少	やや少	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			北薩平坦	0	0	1					100	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	
			北薩山間	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大 隅	0	0	15					100	0	0	50	33	33	0	0	33	0	0	
			県 計	0	0	3					100	0	0	9	7	6	0	2	8	0	0	
がみし類	やや多	やや多	南 薩	445	35	47			10	25	65	40	55	40	25	45	83	20	30	65	70	調査月日：9月1～8日（出穂期～傾穂期） 調査ほ場数：108ほ場：27地点×4ほ場 本田すくい取り調査(20回振り) 平均捕獲虫数：本年1.1頭(平年1.2頭) ケヘリガミシ：種別構成比63.5%と最も高い イカリカミシ：捕獲ほ場率3.6%(平年2.5%)
			北薩平坦	2,512	40	37				40	60	54	48	38	33	23	14	33	21	75	33	
			北薩山間	1,788	42	32			3	39	58	25	45	32	36	41	30	32	18	30	33	
			大 隅	2,163	92	67		17	17	58	8	83	75	67	67	33	42	67	83	100	50	
			県 計	6,907	49	42		3	5	41	51	50	53	42	36	32	30	38	32	65	39	

栽培面積：南薩 1,270 ha 北薩平坦 6,280 ha 北薩山間 4,290 ha 大隅 2,360 ha 平年は2016～2025の平均値

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

南 薩：南九州市知覧町 永里(2)・川辺町 古殿(2)・川辺町 勝目(2)、日置市伊集院町 大田(2)、いちき串木野市 大里(2)・・・調査ほ場数：10

北薩平坦：蒲生町 楠田(2)、始良市 三拾町(2)、隼人町 住吉(2)、霧島市国分 上小川(2)、薩摩川内市 宮崎(2)・高江(2)・入来浦之名(2)

阿久根市 鶴川内(2)、高尾野町 東干拓(2)・六月田(2)・・・調査ほ場数：20

北薩山間：さつま町 宮之城時吉(2)・鶴田町大角(2)・中津川(2)、薩摩川内市 祁答院町上手(2)

伊佐市菱刈 前目(2)・田中(2)、伊佐市大口木崎(2)・山野(2)、湧水町 北方(2)・・・調査ほ場数：18

大 隅：曾於市末吉町(2)・大隅町 笠木(2)、鹿屋市野里(2)・・・調査ほ場数：6

県 計：巡回調査地点数：27地点、調査ほ場数：54ほ場