

作物名	病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%, 頭, 枚)					備 考
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	評価	平年	
サトウキビ	葉焼病	やや少	やや少	奄美	590	8	20				8	93	22	12	13	14	10	18	32	40	14	22	5茎当り 病斑面積	奄美	0.0	やや少	(1.5)	奄美大島：少3
		並	並	熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5茎当り 病斑面積	熊毛	0.0	並	(0.0)	
サトウキビ	メイチュウ類	やや多	やや多	奄美	1,462	19	10			5	14	81	0	4	3	4	5	8	21	23	10	25	20株当り 被害茎率	奄美	0.7	多	(0.3)	奄美大島：少3 徳之島：中2、少3
		やや多	多	熊毛	498	20	8				20	80	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	20株当り 被害茎率	熊毛	0.5	多	(0.1)	種子島：少2
サトウキビ	バッタ類	やや少	やや少	奄美	2,358	30	39				30	70	48	32	62	34	34	24	32	40	36	46	20株当り 食害面積	奄美	0.4	やや少	(1.1)	奄美大島：少1 徳之島：少1 沖永良部島：少6 与論島：少4
		並	並	熊毛	0	0	12					100	0	100	0	0	0	0	20	0	0	0	20株当り 食害面積	熊毛	0.0	並	(0.1)	
サトウキビ	ツマジロクサヨトウ	やや多	多	奄美	983	13	3				13	88								2	3	2	20株当り 新葉部 被害率	奄美	0.2	多	(0.0)	奄美大島：少1 徳之島：少3
		並	並	熊毛	0	0	0					100								0	0	0	20株当り 新葉部 被害率	熊毛	0.0	並	(0.0)	

※その他特記事項

●調査地点

奄美地域40ほ場調査【奄美大島5、喜界島5、徳之島15、沖永良部10、与論島5】 熊毛地域5ほ場調査【種子島5】

但し、メイチュウ類については奄美地域43ほ場調査【奄美大島10、喜界島10、徳之島20、与論島3】 熊毛地域10ほ場調査【種子島10】

（メイチュウ類：徳之島以南については、新植夏植の植付時期が遅く調査可能ほ場が少なかったため、調査ほ場数を変更（徳之島：通常30ほ場→20ほ場、沖永良部島：通常20ほ場→調査なし、与論島：通常10ほ場→3ほ場））

ツマジロクサヨトウについては奄美地域32ほ場調査【奄美大島5、喜界島10、徳之島14、与論島3】 熊毛地域5ほ場調査【種子島5】

（ツマジロクサヨトウ：徳之島以南については、新植夏植の植付時期が遅く調査可能ほ場が少なかったため、調査ほ場数を変更（徳之島：通常15ほ場→14ほ場、沖永良部島：通常10ほ場→調査なし、与論島：通常5ほ場→3ほ場））

※ 栽培面積：奄美地域7,860ha（夏植え:781ha、春植え:1,043ha、株出し:5,403ha、新植夏植え:633ha）

熊毛地域2,492ha（夏植え:172ha、春植え:403ha、株出し:1,765ha、新植夏植え:153ha）

（「令和6年産さとうきび及び甘しや糖生産実績」（令和7年9月 県農産園芸課）から出典）

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。