

令和8年 9月 野菜病害虫発生予察巡回調査月報 ー露地 ー										調査年月日		令和8年 (2026年 9月10～18日)															
作物名	作型	栽培面積 ha		病害虫名	総合 概評	概評	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)		発生ほ場率 (%)													調査 ほ場数	記 事	
								本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
根 深 ネ ギ	春まき	141	精 査	べと病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	伊佐(協力員) 日置 鹿屋	計 12	
				さび病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0			
				○ 黒斑病	－	－	118	83	－			25	58	17	－	－	－	－	－	－	－	－	58	33		4	伊佐:中3、少1、日置:少3、鹿屋:少3
				アブラムシ類	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0		4	
				ネギコガ	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0		4	
				○ ネギハモグリバエ	－	－	94	67	－		8	17	42	33	－	－	－	－	－	－	－	－	67	58			伊佐:多1、日置:少3、鹿屋:中2、少2
				○ アザミウマ類	－	－	71	50	－		8		42	50	－	－	－	－	－	－	－	－	0	42			伊佐:多1、日置:少2、鹿屋:少3
				○ ハスモンヨトウ	－	－	12	8	－				8	92	－	－	－	－	－	－	－	－	17	8			日置:少1
				○ シロイチモジヨトウ	－	－	94	67	－			8	58	33	－	－	－	－	－	－	－	－	8	25			日置:中1、少3、鹿屋:少4
			達 観	白絹病	－	－	47	33	－				33	67	－	－	－	－	－	－	－	－	17	0		伊佐:4	
				軟腐病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0			
				疫病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0			
				その他																						主な品種:夏扇4号、夏の宝山 生育時期:茎葉伸長期	
ダイコン	秋まき	1,126	精 査	軟腐病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	知覧 溝辺 鹿屋 大崎(協力員)	計 10	
				アブラムシ類	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0			
				ハイダラノメイガ	－	－	113	10	－				10	90	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0		2	溝辺:少1
				コナガ	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0		2	
				○ ハスモンヨトウ	－	－	563	50	－			20	30	50	－	－	－	－	－	－	－	8	8	0		2	知覧:中1、少1、溝辺:少1、大崎:中1、少1
				ヨトウガ	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0		4	
			達 観	モザイク病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0			
				萎黄病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0			
				べと病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0			
				白さび病	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0			
				ダイコンサルハムシ	－	－	0	0	－					100	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0			
				キスジノミハムシ	－	－	563	50	－				50	50	－	－	－	－	－	－	－	0	8	0		知覧:2、大崎:3	
				その他																						主な品種:夏みどり、夏の守 生育時期:知覧:発芽～茎葉伸長期 溝辺、鹿屋、大崎:茎葉伸長期 溝辺、鹿屋:ヒメナガメの寄生、溝辺:ウワバ類寄生確認	

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

注3)「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。

注4)○:予報に掲載。

令和8年 9月 野菜病虫害発生予察巡回調査月報 ー露地ー																調査年月日		令和8年 (2026年 9月10～18日)									
作物名	作型	栽培面積 ha		病虫害名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)											調査ほ場数	記事
								本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
キャベツ	冬どり	733	精査	軟腐病	やや少	やや少	0	0	2					100	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	計 12 山川 4 溝辺 4 串良 4		
				黒腐病	やや少	やや少	0	0	7					100	0	17	8	25	0	0	17	0	0	8			
				菌核病	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				コナガ	並	やや多	61	8	2				8	92	56	6	17	0	0	0	0	0	0	0			
				○ ハスモンヨトウ	やや多	並	183	25	21			17	8	75	39	56	33	25	8	8	17	25	25	25			
				○ シロイチモジヨトウ	やや多	多	12	8	1				8	92	-	17	0	0	0	0	0	8	0	0			
				オオタバコガ	並	並	0	0	0					100	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0			
				ヨトウガ	並	並	0	0	0					100	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				モンシロチョウ	やや少	やや少	0	0	4					100	0	6	17	0	8	0	8	0	0	0			
				チョウ目害虫被害	少	少	244	33	64				33	67	-	-	-	58	83	33	58	92	83	42			
			アブラムシ類	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			達観	モザイク病	並	並	0	0	0						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				べと病	やや少	やや少	0	0	5						100	0	0	17	25	0	0	0	0	0	0		
				タバコガ	並	並	0	0	0						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				その他																						主な品種：しずはま，彩里，夢ごろも 生育時期：本葉6～10枚前後 山川、串良：ヒメナガメの寄生、山川：ウワバ類寄生確認	

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値（平年値）から統計的に評価したものである。

注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

注3)「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。

注4)○：予報に掲載。