

果樹 病害虫発生予察巡回調査月報
【カンキツ】

令和8年9月9日～17日調査

掲載	病害虫名	総合 概評	概評	品種・地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%)				備考 発生確認地点（下線は多・甚）
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25		本年	評価	平年	
○ かいよう病 春葉	やや少		並	温州	189	25	32				25	75	38	63	50	13	40	30	10	20	30	25	温州	0.9	並	(1.1)	吹上:少1、霧島:少1
			少	甘夏	165	50	74			10	40	50	100	75	75	88	80	70	80	33	60	80	甘夏	4.0	並	(4.3)	阿久根:少2、出水:少1、高尾野:中1、少1、吹上:中1
			少	その他中晩柑	0	0	23					100	47	50	21	13	13	6	13	33	17	17	その他中晩柑	0.0	やや少	(1.0)	
			少	本土・熊毛	354	16	33			2	15	84	50	55	38	28	28	22	21	29	28	29	本土・熊毛	1.6	並	(1.8)	
○ かいよう病 果実	並		並	温州	189	25	18				25	75	13	38	38	13	50	0	10	10	0	13	温州	0.4	並	(0.6)	吹上:少1、霧島:少1
			やや少	甘夏	197	60	78				60	40	100	100	88	75	90	80	70	44	50	80	甘夏	3.6	並	(4.2)	阿久根:少2、出水:少2、高尾野:少2、吹上:少1
			並	その他中晩柑	546	50	48				50	50	56	75	50	21	25	13	38	73	67	67	その他中晩柑	2.2	やや多	(1.4)	屋久島(ホ):少3、坊津:少1、屋久島(ケ):少2
			並	本土・熊毛	932	43	43				43	57	52	70	55	30	40	17	32	47	41	50	本土・熊毛	2.2	並	(1.9)	
○ 黒点病	やや多		並	温州	567	75	75				75	25	100	100	100	100	90	80	40	70	30	38	温州	6.3	やや少	(21.1)	いちき串木野:少2、加世田:少1、吹上:少1、出水:少1、霧島:少1
			並	甘夏	99	30	24				30	70	100	75	50	0	0	10	0	0	0	0	甘夏	2.4	並	(2.0)	阿久根:少1、出水:少2、吹上:少1
			やや多	その他中晩柑	728	67	53	8			58	33	56	63	46	33	38	69	44	53	42	92	その他中晩柑	10.9	多	(4.9)	屋久島(ホ):少3、坊津:甚1、少2、屋久島(ケ):少2
			やや多	本土・熊毛	1,394	64	53	4			60	36	68	70	58	40	50	65	36	52	32	59	本土・熊毛	6.8	並	(7.7)	
赤衣病	一		一	温州	0	0	0					100					0	0	0	0	0	0	※発生の 有無のみ	一	一	一	屋久島(ケ):3
			一	甘夏	0	0	0					100					0	0	0	0	0	0		一	一	一	
			一	その他中晩柑	273	25	12				25	75					25	0	13	33	0	0		一	一	一	
			一	本土・熊毛	273	13	6				13	87					15	0	6	17	0	0		一	一	一	
○ ミカンハダニ	多		多	温州	662	88	35			25	63	13	63	50	50	38	10	50	20	60	10	0	温州	16.4	多	(4.2)	いちき串木野:少1、加世田:少1、吹上:少1、出水:少2、霧島:中2
			やや多	甘夏	132	40	28	10		10	20	60	50	0	13	38	0	40	10	44	50	40	甘夏	16.5	多	(3.5)	出水:甚1、少1、高尾野:中1、少1
			並	その他中晩柑	182	17	15		8		8	83	16	38	4	17	0	25	6	13	0	33	その他中晩柑	8.3	多	(1.2)	坊津:多1、少1
			多	本土・熊毛	975	45	22	2	4	10	29	55	27	36	15	25	3	35	12	34	11	23	本土・熊毛	13.2	多	(2.4)	
○ サビダニ類	並		多	温州	95	13	2	13				88	0	13	0	0	0	0	10	0	0	0	温州	4.0	多	(0.3)	吹上:甚1
			並	甘夏	0	0	1					100	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	甘夏	0.0	並	(0.0)	
			やや少	その他中晩柑	0	0	7					100	6	9	4	17	0	31	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.3)	
			並	本土・熊毛	95	4	5	4					96	5	9	3	10	0	17	4	0	1	0	本土・熊毛	1.1	多	
カイガラムシ類	少		やや少	温州	0	0	4					100	0	0	0	13	0	0	10	10	10	0	温州	0.0	並	(0.1)	
			並	甘夏	0	0	4					100	0	0	0	25	0	0	0	11	0	0	甘夏	0.0	並	(0.2)	
			やや少	その他中晩柑	0	0	6					100	6	6	4	8	13	25	0	0	0	0	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.3)	
			少	本土・熊毛	0	0	6					100	5	5	3	13	7	14	4	5	3	0	本土・熊毛	0.0	やや少	(0.2)	

果樹 病害虫発生予察巡回調査月報
【カンキツ】

令和8年9月9日～17日調査

掲載	病害虫名	総合 概評	概評	品種・地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別面積率 (%)				年次別 発生ほ場率 (%)											発病・発生数 (%)				備考 発生確認地点（下線は多・甚）				
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25		本年	評価	平年					
チャノキイロ アザミウマ	並	並	温州	95	13	6		13			88	38	13	0	0	0	0	0	0	0	13	温州	3.0	多	(0.5)	霧島:多1 阿久根:少1					
		並	甘夏	33	10	6				10	90	50	0	0	0	0	0	10	0	0	0	甘夏	0.2	やや多	(0.1)						
		やや少	その他中晩柑	0	0	9					100	22	3	17	4	6	0	13	0	0	25	その他中晩柑	0.0	やや少	(0.6)						
		並	本土・熊毛	127	6	7		4		2	94	27	5	10	3	4	0	8	0	0	17	本土・熊毛	0.9	並	(0.5)						
○ カメムシ類	並	並	温州	95	13	18				13	88	25	38	13	25	30	0	20	10	10	13	※発生の 有無のみ	-	-	-	吹上:1					
		並	甘夏	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-						
		並	その他中晩柑	0	0	1					100	0	6	0	0	0	0	0	7	0	0		-	-	-						
		並	本土・熊毛	95	4	5				4	96	5	11	3	5	9	0	7	7	3	4		-	-	-						
果実吸蛾類	やや少	少	温州	95	13	59				13	88	63	50	50	25	70	100	90	40	80	25	※発生の 有無のみ	-	-	-	吹上:1					
		並	甘夏	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-						
		並	その他中晩柑	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-						
		やや少	本土・熊毛	95	4	17				4	96	11	9	10	5	22	32	32	14	28	9		-	-	-						
その他		●面積 県本土熊毛 2,138ha 温州 706ha 甘夏 339ha その他中晩柑 1,093ha ※果樹生産統計資料(R5年度産実績)より		●調査ほ場数 温州 8 (南薩 2, 北薩 2, 日置 2, 始良 2) 甘夏 10 (北薩 10) ポンカン 4 (熊毛 4) タンカン 8 (南薩 4, 熊毛 4)																						●平年値：2016～2025年の10年間の平均値					