

【国内】家畜衛生情報 R7-36

<かごしま畜コミ・インフォ>

宮崎県における野生イノシシの豚熱感染事例（22～26 例目）について、情報提供します。

【概要】

○捕獲・発見地点

都城市 捕獲個体：2 頭 死亡個体：1 頭

高原町 捕獲個体：1 頭 死亡個体：1 頭

○経緯

（１）10 月 28 日～11 月 4 日

野生イノシシの捕獲または死亡イノシシを発見

（２）11 月 6 日

計 5 検体を宮崎家畜保健衛生所又は宮崎大学へ送付

（３）11 月 6 日

精密検査を実施したところ、遺伝子検査で陽性（野外株）を確認

※今後、宮崎県の野生イノシシの検査情報については、宮崎県ホームページ等をご確認よろしくお願いします。

※豚熱（CSF）について（宮崎県 HP、これまでのプレスリリース等）

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shinsei-kachikuboeki/shigoto/chikusan_gyo/20250416111920.html

※豚熱（CSF）の概要（宮崎県 HP、検査状況等）

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/shinsei-kachikuboeki/shigoto/chikusan_gyo/20230809_csf_vaccine.html

※豚熱に関する情報（農林水産省 HP）

<https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/index.html>

◎「豚飼養農家の皆様」におかれましては、次の３項目の対策の徹底をお願いします。

（１）ワクチンに頼らない飼養衛生管理の徹底

・野生動物侵入防止対策（農場の防護柵や防鳥ネットの破損等のチェックと修繕など）

・農場に出入りする人や車両等の制限。出入りする場合は、衣服及び長靴等の交換

・農場に出入りする畜産関係車両や人の入退場時、物品の搬入搬出時における

消毒の徹底

- ・と畜出荷の際は、と畜場内での車両の水洗・消毒の徹底
- ・外部導入した豚の隔離と健康観察
- ・農場周囲の草刈り等のイノシシ接近阻止

(2)豚熱ワクチンの適時・適切な接種

(3)特定症状（紫斑，異常豚や流死産の増加，死亡豚の増加等）が認められた場合の家畜保健衛生所への早期通報

豚熱の発生予防対策としては、ワクチンだけに頼ることなく，飼養衛生管理の徹底が重要です。

引き続き、緊張感を持って、侵入防止対策に万全を期していただきますよう、よろしくお願い致します。

なお、本病を疑う症状等が確認された場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所までご連絡ください。

◎「山林に立ち入る皆様」へ

豚熱ウイルスの拡散防止に御協力をお願いします。

- (1)靴の泥は山で落とす
- (2)飲食物は持ち帰る
- (3)家畜がいる施設に近寄らない
- (4)野生イノシシの死体を見つけたら管轄の自治体へ連絡

☆個々の農場で！地域ぐるみで！

農場防疫（バイオセキュリティ）対策 の徹底をお願いします！！

署名

鹿児島県農政部家畜防疫対策課

TEL099-286-3297